

[エトフェンプロックス・カルタップ・
トリシクラゾール・バリダマイシン粉剤]

農林水産省登録 第17304号

性状: 類白色粉末 45 μm以下、浮遊性指数 20 以下

毒性: 普通物

危険物: —

有効年限: 4 年

包装: 3kg × 8

パダン® トレバリダ® ビーム™ 粉剤DL

有効成分: エトフェンプロックス …… 0.50% カルタップ塩酸塩 (PRTR・1種) …… 2.0%
トリシクラゾール …… 1.0% バリダマイシン A …… 0.30%



ビーム™はダウ・アグロサイエンス・エル・エル・シー商標

こちらのバーコードをスマートフォン等で読み取るとi-農カサイトに掲載されている本剤の新しい情報がご覧になれます。また、詳しい読み取り方・最新情報については11頁をご覧ください。

[適用と使用方法]

作物名	適用病害虫名	10アール当り 使用量	使用時期*	総使用回数*
稲	コブノメイガ ニカメイチュウ イネツトムシ ツマグロヨコバイ ウンカ類 フタオビコヤガ アザミウマ類 いもち病 紋枯病	3 ~ 4 kg	21 日前	本 剤: 3回 エトフェンプロックス: 3回 カルタップ: 6回 (#1) トリシクラゾール: 4回 (#2) バリダマイシン: 6回 (#3)
	カメムシ類	4 kg		

使用方法: 散布

#1: 浸種前は1回、浸種後から直播では種時又は移植時までの処理は1回

#2: 育苗箱への処理は1回、本田では3回

#3: 育苗箱灌注は1回、本田では5回

! 効果・薬害等の注意

- 本剤を使用した場合には、チオシクロラム又はベンスルタップを含む剤は使用しない。
- 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しばって散布する。
- 雨露などで稲がぬれているときの散布はさける。(薬害)
- なす、たばこ、野菜類の幼苗及びなし(二十世紀、幸水、新水等)、きく(秀芳の力等)にはかからないように注意する。(薬害)
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

! 安全使用上の注意

- 蚕に対して長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、桑に付着するおそれのある場所では使用をさける。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
 - 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- カルタップによる中毒に対しては動物実験でL-システイン製剤の投与が有効であると報告されている。

- 眼に入らないように注意する。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。(刺激性)
 - 皮ふに付着しないように注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
(弱い刺激性)
 - 散布の際は防護マスクなどを着用する。作業後はうがいをするとともに洗眼する。
 - 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しない。
 - 水産動植物(甲殻類、ドジョウ及び冷水魚)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。養殖池等周辺での使用はさける。
 - 散布後は水管理に注意する。
 - 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
 - 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。
- 12 頁記載の注意事項、(1)、(2)、(3)、(4)－A も合わせてお読み下さい。