

〔カルタップ・トリシクラゾール粒剤〕

農林水産省登録 第14823号

性 状: 淡褐色細粒

毒 性: 劇 物

危 険 物: ー

有効年限: 4 年

包 装: 2kg×8

パダン® ビームTM粒剤

有効成分: カルタップ塩酸塩(PRTR・1種)…4.0% トリシクラゾール ……4.0%



ビームTMはダウ・アグロサイエンス・エル・エル・シー商標

こちらのバーコードをスマートフォン等で読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の新しい情報がご覧になれます。また、詳しい読み取り方・最新情報については11頁をご覧ください。

〔適用と使用方法〕

作物名	適用病虫害名	使用量	使用時期*	総使用回数*	使用方法
稲 苗 (箱育苗)	イネドロオイムシ イネハモグリバエ ツマグロヨコバイ イネミズゾウムシ いもち病	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り 60～80g	移植当日	本 剤: 1回 カルタップ: 6回 (#1) トリシクラゾール: 4回 (#2)	育苗箱の苗の上から均一に散布する。

#1: 浸種前は1回、浸種後から移植時までの処理は1回

#2: 育苗箱への処理は1回、本田では3回



効果・薬害等の注意

- 本剤を使用した場合には、チオシクロラム又はベンスルタップを含む剤は使用しない。
- 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
- 散布は育苗箱中の苗の上から均一に行い、葉に付着した薬剤を払い落とし、そのまま田植機にかけて移植する。
- 育苗箱の土壌表面が乾燥していて、苗を田植機にのせる際に薬剤が落下するおそれがある時は、散布後軽く灌水する。
- 朝露や降雨により葉がぬれている場合は、薬害を生じるおそれがあるので使用しない。また、散布直前の灌水はしない。
- 軟弱徒長苗、老化苗などには薬害を生じるおそれがあるので、使用をさけ健苗に使用する。
- 育苗箱への施用は、必ず移植当日に行う。薬剤施用から移植までの時間が長いと薬害を生じ易くなるので、なるべく移植直前(2～3時間前)に施用する。
- 処理苗を移植する本田の整地が不均整な場合は薬害を生じ易いので凸凹のないように代かきはいねいに行い、移植後田面が露出しないように注意する。移植後は直ちに入水し、水深2～3cm程度に保ち、極端な深水や浅水にならないように注意する。
- 深植の場合には薬害を生じ易いので、深植にならないように注意する。
- 本田が砂質土壌の水田や漏水田、未熟堆肥多用田の場合は使用をさける。
- 移植後低温が続く苗の活着遅延が予測される時や極端な早植や冷水がかりなど低温障害がおこり易い場所、或いは逆に移植後極端な高温(30℃以上)が続くと予測される場合は、薬害を生じ易いので使用をさける。
- 本剤の処理により、時に生育初期の葉先枯、巻葉、黄化などの薬害を生じることもあるので、所定の使用時期、使用量、使用方法を厳守する。



安全使用上の注意



- 蚕に対して長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、桑に付着するおそれのある場所では使用をさける。
- 医薬外用劇物。取扱いには十分注意する。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。

本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受ける。

- カルタップによる中毒に対しては動物実験でL-システイン製剤の投与が有効であると報告されている。
- 眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。(刺激性)
- 皮ふに付着しないように注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
(弱い刺激性)
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、本剤を使用した苗は養魚田に移植しない。
- 水産動植物(甲殻類、ドジョウ)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意する。養殖池等周辺での使用はさける。
- 移植後は水管理に注意する。
- 直射日光を避け、鍵のかかるなるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

12 頁記載の注意事項、(1)、(2)、(3)、(4)－A も合わせてお読み下さい。

〔品目特性〕

- 葉いもちに著効：ピームは箱処理により稲体内に吸収され、いもち病菌の侵入を長期間に防ぎますので、葉いもちにすぐれた効果を発揮します。
- 本田初期害虫に著効：パダンは箱処理により稲体内に吸収され、イネドロオイムシなど本田初期害虫の食害を長期間防止し、ツマグロヨコバイによる萎縮病・黄萎病の感染も防ぎます。
- 省力的かつ経済的：1回の施用でいもち病と初期害虫を長期間防除できますので、きわめて省力的です。また薬量も本田散布剤にくらべて少量ですみ経済的です。