

〔クロチアニジン・  
フェリムゾン・フサライド水和剤〕

農林水産省登録 第21702号  
 性 状：類白色水和性粘稠懸濁液体  
 毒 性：普通物  
 危 険 物：—  
 有効年限：1ℓ：3年、5ℓ：2年  
 包 装：1ℓ×10、5ℓ×4

# ブラシダントツ® フロアブル

有効成分：クロチアニジン……………6.6% フェリムゾン……………15.0%  
 フサライド……………15.0%

殺虫剤分類	4A
殺菌剤分類	U14,16.1



「住友化学農業ガイド」の見方：i-農力サイトの「製品情報」、「農業ガイドを見る」から、「農業ガイドの見方」をご覧ください。  
 本剤の最新情報：こちらのQRコードを読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の最新情報がご覧いただけます。

## 〔適用と使用方法〕

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール当り 使用液量	使用時期*	総使用回数*	使用方法
稲	いもち病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) ごま葉枯病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 イナゴ類	1000倍	60~150ℓ	7日前	本 剤：2回 クロチアニジン：4回 (＃1) フェリムゾン：2回 フサライド：3回	無人ヘリコ プターによ る散布
	いもち病 ウンカ類 カメムシ類	8倍	800ml			
		30倍	3ℓ			散布
		300倍	25ℓ			

＃1：直播では種時又は移植時までの処理は1回、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回

## ⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせて薬液を調製し、使いきる。
- 長期間貯蔵しておくとは分離するので、使用の際は容器をよく振って均一な状態に戻してから所定量を取り出す。なお、希釈する場合は、所定量の水に加えてから十分攪拌する。(分離)
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけすみやかに散布する。
- たばこ、けいとう及びだいず・あずき・いんげんまめの幼植物には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布する。
- 稲に300倍希釈で使用する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用する。
- 使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないよう注意し、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

### 〈空中散布及び無人ヘリコプター散布としての注意〉

- 散布は各散布機種の散布基準に従って実施する。
- 散布機種に適合した散布装置を使用する。
- 作業中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他装置の十分な点検を行う。
- 散布薬液の飛散によって他の動植物及び自動車やカラートタンの塗装、大理石や御影石等に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、また散布区域・周辺の諸物件に十分注意する。

- 水源池、飲料用水等に本剤が飛散流入しないように十分注意する。
- 散布終了後は、次の事項を守る。
  - 使用後の空の容器は放置せず、適切に処理する。
  - 使用残りの薬剤はしっかりと密栓し、必ず安全な場所に責任者を決めて保管する。
  - 機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は適切に処理する。



### 安全使用上の注意



- 蚕に対して影響があるので、桑に付着するおそれのある地域では使用しない。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
  - ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しない。
  - 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意する。
- 誤飲などのないよう注意する。

誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。  
使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
- 散布液調製時及び散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。  
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
- 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管する。

「[農業ガイドの見方](https://www.i-nouryoku.com/prod/search/) (<https://www.i-nouryoku.com/prod/search/> [農業ガイドの見方](#) [.pdf](#))」の「3. 注意事項：(1)、(2)、(3)、(4) - D」も合わせてお読み下さい。

### 〔品目特性〕

- いもち病に対する治療効果と予防効果を合せ持つ「ブラシン」と、カメムシ類、ウンカ類に優れた防除効果を示す「ダントツ」との殺虫殺菌混合剤です。空中散布・無人ヘリコプターによる散布が可能です。