

【イマゾスルフロン・カフェンストロール・
ベンゾビシクロン粒剤】

農林水産省登録 第21415号
性 状：類白色細粒
毒 性：普通物
危 険 物：—
有効年限：5 年
包 装：1kg×12

イッテツ® 1 キロ粒剤

有効成分：イマゾスルフロン …………… 0.90% カフェンストロール …………… 3.0%
ベンゾビシクロン …………… 2.0%

除草剤分類 2,15,27



「住友化学農業ガイド」の見方：i-農力サイトの「製品情報」、「農業ガイドを見る」から、「農業ガイドの見方」をご覧ください。
本剤の最新情報：こちらのQRコードを読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の最新情報がご覧になれます。

〔適用と使用法〕

作物名	適用雑草名	使用時期*	10アール 当り 使用量	総使用回数*	使用方法
移植 水 稲	一年生雑草 及び 多年生広葉雑草 アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植後 5日～ ノビエ 2.5葉期 ただし、 移植後 30日まで	1 kg	本 剤：1回 イマゾスルフロン：2回 カフェンストロール：1回 ベンゾビシクロン：3回	湛水散布
直播 水 稲	一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲 1葉期～ ノビエ 2.5葉期 ただし、 収穫90日前 まで			

⚠ 効果・薬害等の注意

●主要雑草に対する散布適期幅

ホタルイ	2葉期まで	セリ	再生前から再生始期まで
ウリカワ	2葉期まで	クログワイ	発生始期まで
ヘラオモダカ	2葉期まで	オモダカ	発生始期まで
ミズガヤツリ	2葉期まで	コウキヤガラ	発生始期まで
シズイ	草丈3cmまで	アオミドロ・藻類	発生前
ヒルムシロ	発生期まで	による表層はく離	

○本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに時期を失しないように散布する。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意する。

○シズイは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないの、有効な剤との組合わせて使用する。

- 使用量に合わせて秤量し、使いきる。
- 移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用する場合には雑草の発生状況をよく観察し、時期を失しないように適期に散布するよう注意する。

- 散布の際は水の出入りを止めて湛水状態（水深3～5cm）で、まきむらが生じないように均一に散布する。また、極端な浅水や深水での使用はさける。
- 散布後3～4日間はそのまま湛水を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしないようにし、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしない。また入水は静かにおこなう。
- 浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平化作業及び植付けはていねいにおこなう。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいにおこなう。
- 直播水稲で使用する場合、稲の根が露出する条件では葉害を生じるおそれがあるので注意する。
- 以下のような条件下では葉害が発生するおそれがあるので使用をさける。
 - 砂質土壌の水田及び漏水の大きな水田（減水深が2cm/日以上）。
 - 軟弱な苗を移植した水田。
 - 極端な浅植えの水田。
- 著しい多雨条件では除草効果が低下する場合があるので使用はさしひかえる。
- 本剤を使用した水田の田面水は、他作物の灌水に用いない。
- 殺草特性からいぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意する。
- いぐさ栽培予定水田では使用しない。
- 移植前に生育したミズガヤツリには効果が劣るので、物理的防除方法などを用いて移植前に防除してから使用する。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。



安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので養魚田では使用しない。
- 水産動植物（藻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 散布後は水管理に注意する。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

「[農業ガイドの見方](https://www.i-nouryoku.com/prod/search/) (<https://www.i-nouryoku.com/prod/search/> 農業ガイドの見方 .pdf)」の「3. 注意事項：(1)、(2)、(3)、(4)－E」も合わせてお読み下さい。

〔品目特性〕

- イマゾスルフロンに、ノビエに対して高い効果を示すカフェンストロールと、各種一年生雑草、多年生雑草に高い効果を示すベンゾピシクロンを合理的に配合した水稲用除草剤です。
- 残効期間が長い。
後次発生が問題となるノビエ、ホタルイ等に対し発生を長期間抑制します。