

〔シハロホップブチル粒剤〕

農林水産省登録 第19794号

性 状：類白色細粒、水溶性パック入り、1パック 50g

毒 性：普通物

危 険 物：—

有効年限：3 年

包 装：1kg (50g × 20) × 12 袋

アグロス

クリンチャー™ジャンボ

有効成分：シハロホップブチル ……………1.8%

除草剤分類 1 クリンチャー™はコルテバ・アグリサイエンスならびにその関連会社商標



「住友化学農業ガイド」の見方：i-農力サイトの「製品情報」、「農業ガイドを見る」から、「農業ガイドの見方」をご覧ください。
本剤の最新情報：こちらのQRコードを読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の最新情報がご覧になれます。

〔適用と使用方法〕

作物名	適用雑草名	使用時期*	10 アール当り 使用量	総使用回数*	使用方法
移植水稻	ノビエ、 キシウスズメノヒエ、 アゼガヤ	移植後 7 日～ ノビエ 4 葉期 但し、収穫 30 日前まで	小包装 (パック) 20 個 (1 kg)	本 剤：2 回 シハロホップブチル：3 回	水田に小包装 (パック) のまま投げ入れる。
		移植後 25 日～ ノビエ 5 葉期 但し、収穫 30 日前まで	小包装 (パック) 30 個 (1.5 kg)		
直播水稻	ノビエ	は種後 10 日～ ノビエ 3 葉期 但し、収穫 30 日前まで	小包装 (パック) 20 個 (1 kg)		
		は種後 25 日～ ノビエ 4 葉期 但し、収穫 30 日前まで	小包装 (パック) 30 個 (1.5 kg)		



効果・薬害等の注意

- 小包装 (パック) に使用しているフィルムは水溶性のため、ぬれた手や汗ばんだ手で作業したり、降雨等で破袋しないように注意する。
- 本剤は水溶性フィルムで小包装した製剤をそのまま、10 アール当り 20 個 (移植水稻でノビエ 4 葉期まで、直播水稻でノビエ 3 葉期まで) 又は 30 個 (移植水稻ではノビエ 5 葉期まで、直播水稻ではノビエ 4 葉期まで) の割合で水田に均一に投げ入れる。
- キシウスズメノヒエ防除は展開葉が水面に接する条件で使用する。
- アゼガヤには、草丈 20 cm まで有効なので時期を失しないように散布する。
- 広葉雑草には効果がないので、広葉雑草が混在する圃場ではそれらに有効な剤と組み合わせで使用する。
- 藻類または表層剥離の発生しやすい水田では、有効な剤との組み合わせで使用する。
- 砂質土壌の水田及び漏水田 (減水深 2 cm/日以上) では使用をさける。
- 散布に当っては水の出入りを止めて湛水のまま田面に均一に散布し、少なくとも 3～4 日間は通常の湛水状態 (水深 3～5 cm 程度) を保ち、散布後 7 日間は落水、かけ流しはしない。
- 本剤はその殺草特性から、とうもろこし、食用びえ、ソルガムなどのイネ科作物の生育を阻害するおそれがあるので、散布田の水田水をこれら作物に灌水しないようにする。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用する。特に初めて使用する場合や異常気象

時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受ける。

- 必要量を購入し、できるだけ残すことなく使い切る。散布後の空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理する。



安全使用上の注意

- 濡れた手で触らない。
- 水溶性フィルムが破裂した場合は以下の点に注意する。
眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗いし、眼科医の手当てを受ける。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう注意して使用する。
- 散布後は水管理に注意する。
- 空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。吸湿性があるので湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を強く閉じて保管する。
また、強く加圧されると包装材フィルムが劣化するおそれがあるので下積みにならないようにする。

「[農業ガイドの見方](https://www.i-nouryoku.com/prod/search/) (<https://www.i-nouryoku.com/prod/search/> [農業ガイドの見方.pdf](#))」の「3. 注意事項：(1)、(2)、(3)、(4)－E」も合わせてお読み下さい。