

〔ペンタゾン粒剤〕

農林水産省登録 第16117号

性 状：淡褐色細粒

毒 性：普通物

危険物：—

有効年限：5 年

包 装：3 kg×8袋

住化

バサグラン®粒剤 (ナトリウム塩)

有効成分：ペンタゾンナトリウム塩(ペンタゾン)……11.0%

除草剤分類 6

バサグランはBASF社の登録商標



農業ガイドの適用表内(*)および各項目については、i-農力サイトの「製品情報」や「農業ガイドを見る」から、「農業ガイドの見方」をご参照ください。

本剤の最新情報：こちらの2次元バーコードを読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の最新情報をご覧になります。

〔適用と使用方法〕

作物名	適用雑草名	使用時期*	10 アール 当り使用量	総使用回数*	使用方法
移植水稻	水田一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ クログワイ エゾノサヤヌカグサ シズイ	移植後 15～55 日 但し 60 日前	3～4 kg	本 剤：1 回 ペンタゾン：2 回	落水散布 又はごく浅く 湛水して散布
直播水稻	水田一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	稲3葉期～ 入水 50 日後 但し 60 日前	3 kg		

⚠ 効果・薬害等の注意

- 本剤は水の移動に伴う移行性が大きく、一般に水深の浅いほど効果が安定する。
 - 使用にあたっては落水状態（足跡に水が残っている状態）にして水の出入りをとめ、まきむらのないように均一に散布する。
 - 水を落とすことができないところでは漏水のない水田に限り、できるだけ浅水状態（雑草が水面上に出る状態）にしてまきむらのないように均一に散布する。
 - 散布後少なくとも3日間（浅水処理は5日間）はそのままの状態を保ち、入水、落水、かけ流しはしない。また、散布後7日間は降雨の有無にかかわらず落水しない。
 - 処理後2日以内に降雨があると効果が不十分になるおそれがあるので、晴天の持続する時を選んで使用する。
 - 深水にすると効果が劣るので注意する。
- イネ科雑草には効果が劣るので、田植前後の土壌処理除草剤で一年生雑草を防除した後、多年生水田雑草及び一年生広葉雑草の防除を目的として使用する。
- 砂質土及び漏水のはげしい水田では使用しない（減水深2 cm/日以上）。
- 本剤は生育期に入った雑草に効果があるが、雑草、特に多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので必ず適期に散布する。ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカでは発生盛期から増殖中期、オモダカでは発生盛期から発生摘期まで、クログワイで

は草丈 15 cm以下、エゾノサヤヌカグサでは1～4葉期、シズイでは草丈 10～30 cmが本剤散布の適期である。

- クログワイ防除は、必要に応じて有効な前処理剤との組み合わせで使用する。
- 本剤の使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。



安全使用上の注意

- 誤食などのないように注意する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 水産動植物（藻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 散布後は水管理に注意する。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。