

[シペルメトリン乳剤]

農林水産省登録 第16589号

性 状: 淡黄色澄明可乳化油状液体

毒 性: 劇 物

危 険 物: 第4類第2石油類 III

有効年限: 5 年

包 装: 100 ml × 60 本、500 ml × 20 本

アグロスリン® 乳剤

有効成分: シペルメトリン 6.0%

殺虫剤分類 **3A**



「住友化学農業ガイド」の見方: i-農力サイトの「製品情報」、「農業ガイドを見る」から、「農業ガイドの見方」をご覧ください。
本剤の最新情報: こちらのQRコードを読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の最新情報をご覧いただけます。

[適用と使用方法]

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10アール当り使用液量	使用時期*	総使用回数*			
かんきつ	チャノキロアザミウマ ミカンハモグリガ アブラムシ類 コアオハナムグリ・ケシキスイ類 カメムシ類	1000~2000倍	200~700ℓ	7日前	3回			
	アブラムシ類・オンシツコナジラミ	2000倍	100~300ℓ	前日	5回			
きゅうり	ミナミキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	1000倍						
	すいか	アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ				1000~2000倍		
メロン		アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ トマトハモグリバエ				2000倍 1000倍		
	ほうれんそう	ヨトウムシ・アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ				2000倍 1000倍		
なす		アブラムシ類 オンシツコナジラミ				2000倍		
	トマト	シロイチモジヨトウ				1000倍		
ねぎ		ネギハモグリバエ・アブラムシ類 ネギコガ・アザミウマ類				2000倍		
	わけぎ	シロイチモジヨトウ アブラムシ類・ネギコガ ネギハモグリバエ・アザミウマ類				1000倍 2000倍		
たまねぎ		ネギハモグリバエ アザミウマ類 シロイチモジヨトウ				※48倍	7日前	5回
	にら	ネギアザミウマ・ヨトウムシ類 ネギコガ・ハモグリバエ類 クロバネキノコバエ類	2000倍	100~300ℓ	前日	3回		
にら(花茎)		アブラムシ類						
	レタス						アブラムシ類	
非結球レタス		アブラムシ類						
	ピーマン						アブラムシ類・アザミウマ類 ハスモンヨトウ	
かぼちゃ		アワノメイガ・アブラムシ類 アワヨトウ						1000~2000倍
	1000倍							

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10アール当り 使用液量	使用時期*	総使用回数*
キウイフルーツ	キイロマイコガ キクビスカシバ キウイヒメヨコバイ カメムシ類	1000~2000倍	200~ 700ℓ	7日前	3回
たばこ	タバコアオムシ ヨトウムシ アブラムシ類 オンシツコナジラミ	2000~3000倍	25~ 180ℓ	発生初期~ 10日前	2回
非結球あぶらな 科葉菜類(チン ゲンサイを除く)	アブラムシ類	2000倍	100~ 300ℓ	前日	
チンゲンサイ	アオムシ			5回	
いちご	アブラムシ類				発生初期
きく			60~ 150ℓ	21日前	3回
麦類				前日	
らっかせい			7日前		
あずき	ノメイガ類		100~ 300ℓ	14日前	5回
ごぼう	アブラムシ類 ヒョウタンゾウムシ類			7日前	3回
にんじん	ヨトウムシ		35日前		
だいず	マメシンクイガ カメムシ類・フタスジヒメハムシ ジャガイモヒゲナガアブラムシ			3日前	1回
えだまめ	マメシンクイガ カメムシ類・フタスジヒメハムシ	200~ 700ℓ	発生初期		
いんげんまめ さやいんげん	アブラムシ類 インゲンテントウ			2000倍	7日前
えごま(種子)	ウリハムシモドキ	100~ 300ℓ	3日前		
食用ぎく	アブラムシ類・アザミウマ類 オオタバコガ・ハスモンヨトウ ヨトウムシ			1500倍	14日前
カーネーション	アブラムシ類・ヨトウムシ類	2000倍	200~ 700ℓ	発生初期	6回
しきみ	アブラムシ類				
さかき	アブラムシ類 サカキブチヒメヨコバイ	2000倍	100~ 300ℓ	7日前	1回
しそ科葉菜類 (しそ、バジルを除く)	アブラムシ類				
しそ	アブラムシ類・ヒシモンヨコバイ	1500倍	100~ 300ℓ	3日前	2回
しそ(花穂)	アブラムシ類				
バジル		アブラムシ類	1500倍	100~ 300ℓ	14日前
食用プリムラ	アブラムシ類				

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10アール当り 使用液量	使用時期*	総使用回数*
食用金魚草	アブラムシ類	1500倍	100~ 300ℓ	14日前	2回
食用エキザカム					
食用カーネーション					
食用せんにちこう					
食用トレニア					
食用なでしこ					
食用パンジー					
未成熟ささげ	ネギアザミウマ	2000倍		前日	3回
葉にんにく				3日前	5回
らっきょう					2回
エンサイ				ハスモンヨトウ	
アスパラガス	ヨトウムシ		100~ 500ℓ	前日	3回
べぼかぼちゃ (種子)			100~ 300ℓ	7日前	4回
飼料用えんぱく (は種用種子)	コクヌストモドキ	300倍	種子1kg 当り希釈 液20ml	貯蔵前 (種子吹き付 け処理又は 塗沫処理)	1回

表中の※は無人航空機による散布

使用方法：散布（飼料用えんぱく（は種用種子）を除く）

効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切る。
- ボルドー液と混用する場合は使用直前に混合する。
- ねぎのシロイチモジヨトウに散布する場合は、食入前の若令幼虫期に散布する。
- 本剤のかんきつでの散布は、場合によりハダニ類が増えることがあるので注意する。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合には次の注意を守る。
 - 散布は各散布機種種の散布基準に従って実施する。
 - 散布機種種に適合した散布装置を使用する。
 - 散布中薬液の漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行う。
- 本剤で処理したえんぱくの種子は食用及び飼料用には用いない。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意



- 蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、桑に付着するおそれのある場所では使用しない。

- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しない。
 - 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。
 - 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意する。

誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせる。
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受ける。
- 原液は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調整時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 皮ふに対して刺激性があるので、皮ふに付着しないように注意する。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 散布の際は防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用する。また散布液を吸い込んだり、浴びたりしないように注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- 本剤による中毒の治療法としては動物実験でメトカルバモール製剤の投与が有効であると報告されている。
- 本剤はのど、鼻、皮ふなどを刺激する場合、またかゆみを生じる場合があるので注意する。
- 摘果等の作業の際は、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。
- 水産動植物（魚類）に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用する。養殖池周辺での使用はさける。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意する。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
- 危険物第四類第二石油類に属するので火気には十分注意する。
- 火気をさけ、直射日光の当たらない鍵のかかる低温な場所に密栓して保管する。

「[農業ガイドの見方](https://www.i-nouryoku.com/prod/search/) (<https://www.i-nouryoku.com/prod/search/> [農業ガイドの見方](#) [.pdf](#))」の「3. 注意事項：(1)、(2)、(3)、(4) - G」も合わせてお読み下さい。

〔品目特性〕

- 合成ピレスロイド系殺虫剤です。
- チョウ目、アブラムシ類に効果があります。またとくにアザミウマ類、カメムシ類には有効です。