

[C Y A P 水和剤]

農林水産省登録 第12090号

性状: 淡黄褐色水和性粉末 63μm以下

毒性: 普通物

危険物: ー

有効年限: 4年

包装: 500g×20袋、1kg×20袋

住友

# サイアノックス®水和剤

有効成分: C Y A P ..... 40.0%



こちらのバーコードをスマートフォン等で読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の新しい情報がご覧になれます。また、詳しい読み取り方・最新情報については11頁をご覧ください。

## 〔適用と使用方法〕

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10アール当り 使用液量	使用時期*	総使用回数*
りんご	アブラムシ類 キンモンホソガ シンクイムシ類 ハマキムシ類 クワコナカイガラムシ カメムシ類 オオタバコガ	1000倍	200~700ℓ	14日前	1回
マルメロ	シンクイムシ類 アブラムシ類			45日前	2回
ネクタリン	シンクイムシ類 ハマキムシ類 アブラムシ類 モモハモグリガ カイガラムシ類			21日前	
すもも	アブラムシ類 シンクイムシ類			21日前	
ぶどう	ブドウスカシバ フタテンヒメヨコバイ ハマキムシ類			14日前	
おうとう	ケムシ類			7日前	
みかん	コナカイガラムシ類			30日前	
ブルーベリー	ドクガ マイマイガ			21日前	3回
もも	アブラムシ類 ハマキムシ類 シンクイムシ類 モモハモグリガ カイガラムシ類			7日前	
なし (有袋栽培)	アブラムシ類 シンクイムシ類			45日前	
なし (無袋栽培)	ハマキムシ類 クワコナカイガラムシ				
かき	フジコナカイガラムシ カキノヘタムシガ カメムシ類				

使用方法: 散布

## ⚠ 効果・薬害等の注意

- ボルドー液と混用する場合は散布直前に行い、できるだけ早く使用する。ただし、その他アルカリ性の強い農薬との混用はさける。
- りんごの「旭」およびその近縁品種には薬害のでるおそれがあるので注意する。

- ぶどうの無袋栽培で使用する場合、果粒に汚れが生じるので果粒肥大中期以降の散布はさける。



## 安全使用上の注意



- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
  - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
  - 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。
  - 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- 誤飲、誤食などのないよう注意する。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
- 本剤の解毒剤としては、動物実験で硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤が有効であると報告されている。
- 眼に入らないよう注意する。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。（刺激性）
- 散布の際は、農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用する。  
また散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
- 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密封して保管する。

## 〔品目特性〕

- 有機リン系殺虫剤です。
- チョウ目害虫及び吸汁性害虫であるアブラムシ類などに対し速効的に作用するが、残効は長くありません。殺卵効果もあります。