

[C Y A P 粉 剤]

農林水産省登録 第10807号

性 状 : 類白色粉末 45 μ m以下

毒 性 : 普通物

危 険 物 : —

有効年限 : 3 年

包 装 : 3kg \times 8袋

住化

サイアノックス®粉剤

有効成分 : C Y A P3.0%

殺虫剤分類 1B



「住友化学農業ガイド」の見方 : i- 農力サイトの「製品情報」、「農業ガイドを見る」から、「農業ガイドの見方」をご覧ください。
本剤の最新情報 : こちらの QR コードを読み取ると i- 農力サイトに掲載されている本剤の最新情報をご覧いただけます。

[適用と使用方法]

作物名	適用害虫名	10アール当たり 使用量	使用時期*	総使用回数*
かき きゃべつ	アオムシ アブラムシ類	3 ~ 5 kg	21 日前	2 回
はくさい だいこん	コナガ ヨトウムシ若齢幼虫		14 日前	
きゅうり	アブラムシ類	3 ~ 4 kg	収穫開始3日前	

使用方法 : 散布

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
- 使用量は作物体の大きさに応じて所定薬量内で増減し、特に稚苗期の苗には薬害を生じることがあるので少なめにする。

⚠ 安全使用上の注意

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
 - 関係機関（都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- 誤食などのないよう注意する。

誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
- 本剤の解毒剤としては、動物実験で硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤が有効であると報告されている。
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。

また粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

[品目特性]

- 有機リン系殺虫剤です。
- チョウ目害虫及び吸汁性害虫であるアブラムシ類などに対し速効的に作用するが、残効は長くありません。殺卵効果もあります。