

[M E P 粉 剤]

農林水産省登録 第 2 0 7 2 6 号

性 状 : 類白色粉末 45 μm以下、浮遊性指数 20 以下

毒 性 : 普通物

危 険 物 : ー

有効年限 : 4 年

包 装 : 3 kg × 8 袋

スミチオン® 粉剤3DL

有効成分 : M E P (PRTR・1種).....3.0%



こちらのバーコードをスマートフォン等で読み取るとi-農カサイトに掲載されている本剤の新しい情報がご覧になれます。また、詳しい読み取り方・最新情報については11頁をご覧ください。

〔適用と使用方法〕

作物名	適用場所	適用害虫名	10アール当り 使用量	使用時期*	総使用回数*
稲	ー	ニカメイチュウ ウンカ類 コブノメイガ カメムシ類 イネドロロイムシ アザミウマ類	3 ~ 4 kg	21 日前	本 剤 : 2 回 (出穂前は 1 回) M E P : 3 回 (#1)
		アワヨトウ	4 kg		
水田作物、 畑作物 (休 耕 田)	ヨシ、オギ、ス スキ、セイタカ アワダチソウ等 の多年生雑草が 優占している休 耕田	カメムシ類	3 ~ 4 kg	ー	4 回
だ い ず	ー	ー	4 kg	21 日前	

#1 : 種もみへの処理は1回、育苗箱散布は1回、本田では2回

使用方法 : 散布

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
- あぶらな科作物には薬害を生ずるおそれがあるので、付近にある場合にはかからないように注意して散布する。
- 本剤はできるだけ飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ見かけ比重がやや大きく、流動性が良いので散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布する。

⚠ 安全使用上の注意

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
 - 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- 本剤の解毒剤としては硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤が有効であると報告されている。
- 眼に入らないよう注意する。
 - 眼に入った場合には直ちに水洗する。(弱い刺激性)
- 散布の際は農薬用マスクなどを着用する。
 - 作業後はうがいをする。
- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しない。

(2019年12月4日現在の内容) 住友化学の農業支援サイト:i 農力<https://www.i-nouryoku.com/>

- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 散布後は水管理に注意する。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

12 頁記載の注意事項、(1)、(2)、(3)、(4)－E も合わせてお読み下さい。

〔品目特性〕

- 稲・だ이지・休耕田のカメムシ類の防除に適した薬剤です。