

〔クロチアニジン粉剤〕

農林水産省登録 第20801号

性 状：類白色粉末45μm以下、浮遊性指数20以下

毒 性：普通物

危 険 物：—

有効年限：5 年

包 装：3kg×8

ダントツ® 粉剤DL

有効成分：クロチアニジン……………0.15%



こちらのバーコードをスマートフォン等で読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の新しい情報をご覧になれます。また、詳しい読み取り方・最新情報については11頁をご覧ください。

〔適用と使用方法〕

作物名	適用害虫名	10アール当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数*	クロチアニジン を含む農薬の 総使用回数*	使用方法
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	3～4 kg	7 日前	3 回	4 回 (#1)	散布
	イナゴ類	4 kg				
	イネドロオイムシ フタオビコヤガ	3 kg				
だ い ず	アブラムシ類 カメムシ類 フタスジヒメハムシ	4 kg			4 回 (は種時の土壌 混和は1回、散 布は3回)	

作物名	適用場所	適用害虫名	10アール当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数*	クロチアニジン を含む農薬の 総使用回数*	使用方法
水田作物、 畑作物 (休耕地)	ヨシ、オギ、スキ、 セイタカアワダチソウ等の 多年生雑草が 優占している 休耕地	カメムシ類	3～4 kg	—	4 回	4 回以内	散布

#1：直播では種時又は移植時までの処理は1回、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回

⚠ 効果・薬害等の注意

- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見掛け比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布する。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

⚠ 安全使用上の注意

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
 - 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意する。

(2017年12月20日現在の内容)住友化学の農業支援サイト:i-農力 <https://www.i-nouryoku.com/>

- 眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗する。(弱い刺激性)
- 散布の際は農薬用マスクなどを着用する。作業後はうがいをする。
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

〔品目特性〕

- 稲の斑点米カメムシ類に対して高い防除効果を発揮します。(殺虫効果、吸汁抑制効果)
- カメムシ以外にもウンカ類、ツマグロヨコバイ、イナゴ類、イネドロオイムシなど水稻の幅広い害虫に対して優れた防除効果を発揮します。
- 有機リン系、カーバメイト系、合成ピレスロイド系薬剤に対する感受性が低下した害虫にも高い効果を示します。
- 収穫7日前まで使用できるので、カメムシ防除や収穫期近くのウンカ類の防除にも対応できます。
- ウンカ・ヨコバイ等の重要天敵であるクモ類に対する影響が少ない。