

〔クロチアニジン粉剤〕

農林水産省登録 第21242号

性状：類白色粉末 45μm以下、浮遊性指数 20以下

毒性：普通物

ダントツ® H粉剤DL

危険物：—

有効年限：5年

包装：3kg×8

有効成分：クロチアニジン……………0.50%

殺虫剤分類 4A



「住友化学農業ガイド」の見方：i-農力サイトの「製品情報」、「農業ガイドを見る」から、「農業ガイドの見方」をご覧ください。
本剤の最新情報：こちらのQRコードを読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の最新情報がご覧になれます。

〔適用と使用方法〕

作物名	適用害虫名	10アール当り 使用量	使用時期*	総使用回数*	使用方法
稲	カメムシ類 ウンカ類 ツマグロヨコバイ イナゴ類 イネツトムシ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	3～4kg	7日前	本剤：3回 クロチアニジン：#1	散布
	イネドロオイムシ	3kg			
だ い ず	マメシクイガ ウコンノメイガ	4kg		本剤：3回 クロチアニジン：4回 (は種時の土壌混和は1回、散布は3回)	
	アブラムシ類 カメムシ類 フタスジヒメハムシ	3～4kg			

作物名	適用場所	適用害虫名	10アール当り 使用量	使用時期	総使用回数*	使用方法
水田作物、畑作物(休耕田)	ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田	カメムシ類	3～4kg	—	4回	散布

#1：4回（直播では種時又は移植時までの処理は1回、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回）

⚠️ 効果・薬害等の注意

- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布する。
- 使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

⚠️ 安全使用上の注意

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
 - 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。

- マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意する。
- 眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗する。(弱い刺激性)
- 散布の際は農薬用マスクなどを着用する。作業後はうがいをする。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 散布後は水管理に注意する。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

〔品目特性〕

- 高含量化製剤により効力がアップ
従来のダントツ粉剤DLに比べ有効成分のクロチアニジン含量を高めていますので、殺虫効力と残効性が増し、散布回数の低減が図れ、より高いレベルの防除効果が得られます。
- 稲の斑点米を発生させる主要カメムシ類に対して幅広く優れた効果を示します。