

〔スピネトラム水和剤〕

農林水産省登録 第22909号

性 状：類白色水和性細粒

毒 性：普通物

危 険 物：—

有効年限：5 年

包 装：(100g × 10本) × 2

ディアナ® W D G

有効成分：スピネトラム ……………25.0%

殺虫剤分類 **5**



「住友化学農業ガイド」の見方：i-農力サイトの「製品情報」、「農業ガイドを見る」から、「農業ガイドの見方」をご覧ください。
本剤の最新情報：こちらの2次元バーコードを読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の最新情報がご覧になれます。

〔適用と使用方法〕

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10アール当り 使用液量	使用時期*	総使用回数*	使用方法			
りんご	キンモンホソガ ハマキムシ類 ギンモンハモグリガ	5000～ 15000 倍	200～700 l	前日	2 回	散布			
	シンクイムシ類 ヨモギエダシヤク ケムシ類 キリガ類	5000～ 10000 倍							
もも ネクタリン	モモハモグリガ シンクイムシ類 ハマキムシ類 アザミウマ類								
なし	シンクイムシ類 ハマキムシ類 チュウゴクナシキジラミ アザミウマ類								
おうとう	オウトウショウジョウバエ ハマキムシ類 アザミウマ類								
小粒核果類 (うめ、すももを除く)	ハマキムシ類								
すもも	シンクイムシ類						5000 倍		
ぶどう	ハスモンヨトウ アザミウマ類 ハマキムシ類 クビアカスカシバ						5000～ 10000 倍	2 回	本剤:2回 スピネトラム:3回 (#1)
	ミカンハモグリガ アザミウマ類 コナジラミ類 ミカンキジラミ ヨモギエダシヤク ケムシ類 ハマキムシ類 アゲハ類								
かんきつ	ハスモンヨトウ						10000 倍		
くり	モモノゴマダラノメイガ	100 倍	2 l	無人航空機による 散布					
	シンクイムシ類	10000 倍	200～700 l		散布				

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10アール当り 使用液量	使用時期*	総使用回数*	使用方法
ブルーベリー	オウトウショウジョウバエ ハマキムシ類 アザミウマ類 ブルーベリータマバエ	5000～ 10000 倍	200～700 ℓ	前日	2 回	散布
マンゴー	チャノキイロアザミウマ					
さんしょう(果実)	アザミウマ類					
かき	ハマキムシ類 カキノヘタムシガ					
いちじく	アザミウマ類	5000 倍				
	ショウジョウバエ類	10000 倍				
うめ	ケムシ類 ハマキムシ類	5000～ 10000 倍				

#1：果房浸漬は1回、散布は2回



効果・葉害等の注意

- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法にあわせ調節する。
- 散布液調製後は、そのまま放置せず、できるだけ速やかに散布する。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に葉害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。



安全使用上の注意



- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。桑葉にかかった場合には使用後約1ヶ月間は蚕に給餌しない。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しない。
 - 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。
 - 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意を守る。
 - 散布は各散布機種種の散布基準に従って実施する。
 - 散布にあつては、散布機種種に適合した散布装置を使用する。
 - 散布中、薬液が漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行う。
 - 散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等に影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意する。
 - 散布終了後は次の事項を守る。
 - ・ 使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄する。
 - ・ 機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理する。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。

(2023年3月22日現在の内容) 住友化学の農業支援サイト:i 農力<https://www.i-nouryoku.com/>

- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意する。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

〔品目特性〕

- 広い殺虫スペクトラム：チョウ目害虫に対し、防除効果を発揮します。
- ハマキムシ類に優れた効果：各ステージ（卵・幼虫・成虫）に高い効果を示します。よって、散布適期が広く使いやすい薬剤です。
- 収穫前日まで使用可能です。