

[スピネトラム水和剤]

農林水産省登録 第22909号

性 状：類白色水和性細粒

毒 性：普通物

危 険 物：—

有効年限：3 年

包 装：(100g × 10本) × 2

# ディアナ®WDG

有効成分：スピネトラム……………25.0%



こちらのバーコードをスマートフォン等で読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の新しい情報をご覧になれます。また、詳しい読み取り方・最新情報については11頁をご覧ください。

## [適用と使用方法]

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10アール当り 使用用量	使用時期*	総使用回数*	使用方法
りんご	キンモンホソガ ハマキムシ類 ギンモンハモグリガ	5000~ 15000 倍	200~700 ℓ	前日	2回	散布
	シンクイムシ類 ヨモギエダシヤク ケムシ類 キリガ類	5000~ 10000 倍				
もも ネクタリン	モモハモグリガ シンクイムシ類 ハマキムシ類 アザミウマ類	5000~ 10000 倍				
なし	シンクイムシ類 ハマキムシ類 チュウゴクナシキジラミ アザミウマ類	5000~ 10000 倍				
おうとう	オウトウショウジョウバエ ハマキムシ類 アザミウマ類	5000 倍				
すもも	シンクイムシ類	10000 倍				
ぶどう	ハスモンヨトウ	5000~ 10000 倍				
	アザミウマ類 ハマキムシ類	5000~ 10000 倍				
かんきつ	ミカンハモグリガ アザミウマ類 コナジラミ類 ミカンキジラミ ヨモギエダシヤク ケムシ類 ハマキムシ類 アゲハ類	10000 倍				
	ハスモンヨトウ	10000 倍				
くり	モモノゴマダラノメイガ	5000~ 10000 倍				
アロニア	シンクイムシ類	5000~ 10000 倍				
ブルーベリー	オウトウショウジョウバエ ハマキムシ類	5000~ 10000 倍				
マンゴー	チャノキイロアザミウマ	5000~ 10000 倍				
さんしょう(果実)	アザミウマ類	5000 倍				
かき	アザミウマ類 ハマキムシ類 カキノヘタムシガ	10000 倍				
	アザミウマ類	10000 倍				
いちじく	ショウジョウバエ類	5000~ 10000 倍				
	ケムシ類	5000~ 10000 倍				



## 効果・薬害等の注意

- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法にあわせ調節する。
- 散布液調製後は、そのまま放置せず、できるだけ速やかに散布する。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。



## 安全使用上の注意



- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。桑葉にかかった場合には使用後約1ヶ月間は蚕に給餌しない。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
  - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
  - 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。
  - 関係機関（都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- 眼に入らないよう注意する。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。（刺激性）
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

## 〔品目特性〕

- 広い殺虫スペクトラム：  
チョウ目害虫に対し、防除効果を発揮します。
- ハマキムシ類に優れた効果：  
各ステージ（卵・幼虫・成虫）に高い効果を示します。よって、散布適期が広く使いやすい薬剤です。
- 収穫前日まで使用可能です。