

[フェンバレレート・マラソン水和剤]

農林水産省登録 第15463号

性 状 : 淡褐色水和性粉末 63μm以下

毒 性 : 劇 物

危 険 物 : —

有効年限 : 3 年

包 装 : 100g × 100袋、500g × 20袋

ハクサップ® 水和剤

有効成分 : フェンバレレート ……………10.0% マラソン ……………30.0%

殺虫剤分類 **3A,1B**



「住友化学農業ガイド」の見方 : i- 農力サイトの「製品情報」、「農業ガイドを見る」から、「農業ガイドの見方」をご覧ください。
本剤の最新情報 : こちらのQRコードを読み取るとi- 農力サイトに掲載されている本剤の最新情報をご覧いただけます。

[適用と使用方法]

作物名	適用害虫名	希釈倍数	107-ℓ当り 使用液量	使用時期*	総使用回数*
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ カブラハバチ	1000~2000倍	100~ 300ℓ	35日前	本 剤 : 3回 フェンバレレート : 3回 マラソン : 6回
	キャベツ				
オオタバコガ		1000倍		前日	本 剤 : 5回 フェンバレレート : 5回 マラソン : 5回
はくさい	アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ タマナギンウワバ カブラハバチ	1000~2000倍			
	ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000倍			
レタス	アブラムシ類	1000~2000倍		3日前	本 剤 : 2回 フェンバレレート : 2回 マラソン : 5回
	オオタバコガ	1000倍			
リーフレタス	アブラムシ類	1000~2000倍		14日前	本 剤 : 2回 フェンバレレート : 2回 マラソン : 2回
	オオタバコガ	1000倍			
ブロッコリー	アオムシ	2000倍		30日前	本 剤 : 3回 フェンバレレート : 3回 マラソン : 5回
なす	オンシツコナジラミ アブラムシ類 オオタバコガ				
	かんしょ	ナカジロシタバ イモコガ エビガラスズメ ハスモンヨトウ	1000倍	7日前	本 剤 : 5回 フェンバレレート : 5回 マラソン : 5回
さといも		ハスモンヨトウ			

使用方法 : 散布

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調整し、使い切る。

- 石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性薬剤との混用はさける。
- 幼苗期に使用すると、展開葉に黄化などの薬害を生ずることがあるので、この時期のなすへの使用はさけ、また、キャベツ、はくさい、だいこん、レタス、リーフレタスに使用する場合は所定範囲内の低濃度で散布する。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。



安全使用上の注意



- 蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着するおそれのある場所では使用しない。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
 - 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。
 - 関係機関（都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意する。
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
- フェンバレレートによる中毒に対しては、動物実験でメトカルバモール製剤の投与が有効であると報告されている。
マラソンの解毒剤としては、硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤の投与が有効であると報告されている。
- 眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。(刺激性)
- 本剤はのど、鼻、皮膚などを刺激する場合、また、かゆみを生じる場合があるので注意する。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 水産動植物（魚類）に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用する。養殖池周辺での使用はさける。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
- 直射日光をさけ、鍵のかかるなるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

「[農薬ガイドの見方](https://www.i-nouryoku.com/prod/search/) (<https://www.i-nouryoku.com/prod/search/> 農薬ガイドの見方.pdf)」の「3. 注意事項：(1)、(2)、(3)、(4) - F」も合わせてお読み下さい。

〔品目特性〕

- 合成ピレスロイド系殺虫剤フェンバレレートと有機リン系殺虫剤マラソンとの混合剤です。