

[B T 水 和 剤]

農林水産省登録 第 2 0 6 5 3 号

性 状: 褐色水と性細粒及び微粒

毒 性: 普通物

危 険 物: —

有効年限: 5 年

包 装: 500 g × 20 袋

フローバック® DF

有効成分: パチルス チューリンゲンシ菌の生芽胞及び産生結晶毒素……………10.0%
(力価として 1000B. m. i 単位/mg)



フローバックは VALENT BIOSCIENCES LLC の登録商標

「住友化学農業ガイド」の見方: i- 農力サイトの「製品情報」、「農業ガイドを見る」から、「農業ガイドの見方」をご覧ください。
本剤の最新情報: こちらの QR コードを読み取ると i- 農力サイトに掲載されている本剤の最新情報がご覧になります。

[適用と使用方法]

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 アール当り 使用液量	使用時期*	本剤の 使用回数	BTの 総使用回数*	使用方法
野 菜 類	コナガ アオムシ	1000~2000 倍	100~ 300 ℓ	発生初期 但し、前日	—	—	散布
	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000 倍					
だ い こん きゃべつ は く さ い チンゲンサイ ブロッコリー	ハイマダラノメイガ						
に ん に く	ネギコガ	1000~2000 倍					
ね ぎ		1000 倍					
豆 類 (種 実)	シロイチモジヨトウ	1000~2000 倍					
豆 類 (未 成 熟)							
雑 穀 類 (そばを除く)	アワノメイガ	2000 倍					
そ ば	ハスモンヨトウ						
花き類・観葉植物	オオタバコガ	1000 倍					
飼 料 用 とうもろこし	アワノメイガ	2000 倍	発生初期 但し、前日				

⚠ 効果・薬害等の注意

- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布する。
- 使用に当たっては展着剤を加用することが望ましい。
- アルカリ性の強い石灰硫黄合剤、ボルドー液などの農薬およびアルカリ性の強い葉面施用の肥料などとの混用はさける。
- 本剤は若令幼虫に有効なので、若令幼虫期に時期を失せず散布する。
- 本剤は吸湿すると固化したり、効果が低下したりすることがあるので、貯蔵に当たっては湿気に注意し、特に使用残りの薬剤は密封して乾燥した冷暗所に貯蔵する。
- 空中散布には使用しない。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。



安全使用上の注意



- 蚕に対する毒性があるので、養蚕主産県その他主要養蚕地帯及び養蚕農家、共同飼育場などの周辺では施用しない。また、これら以外の場所でも付近に桑園がある場合は、飛散してかからないよう風向等に十分注意して散布する。なお、本剤の使用に当たっては、散布地域の使用規制に従う。特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
- 眼に入らないよう注意する。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受ける。(刺激性)
- 皮ふに付着しないよう注意する。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。(刺激性)
- 散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

〔品目特性〕

- アイザワイ系のBT生菌剤です。
- ヨトウムシ類を中心とした、広範なチョウ目害虫に有効です。
- 粉立ちが少なく、計量し易いドライフロアブル製剤です。
- 新JAS法に基づく有機農作物の生産に使用できます。