

〔ピロキロン・フラメトピル粒剤〕

農林水産省登録 第19379号

性 状：類白色細粒

毒 性：普通物

危 険 物：—

有効年限：4 年

包 装：3kg×8袋

コラトップ®リンバー®粒剤

有効成分：ピロキロン 5.0% フラメトピル 1.5%



コラトップはシンジェンタ社の登録商標

こちらのバーコードをスマートフォン等で読み取るとi-農カサイトに掲載されている本剤の新しい情報がご覧になれます。また、詳しい読み取り方・最新情報については11頁をご覧ください。

〔適用と使用方法〕

作物名	適用病害名	10アール当り使用量	使用時期*	総使用回数*	使用方法
稲	いもち病 紋枯病	3～4kg	出穂30日前 ～5日前まで	本 剤：2回 ピロキロン：3回 (#1) フラメトピル：2回 (#2)	散布

#1：直播では種時又は移植時までの処理は1回、本田2回

#2：直播では種時又は移植時までの処理は1回



効果・薬害等の注意

- 散布にあたっては湛水状態（水深3cm以上）で播きむらのないように均一に散布し、散布後少なくとも3～4日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしない。
- 漏水のはげしい水田では効果の劣る場合があるので使用をさける。
- 葉いもちに対する初発時の散布は多発の場合、効果が劣ることがあるので、散布時期に注意する。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。



安全使用上の注意

- 皮ふに付着しないよう注意する。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。（刺激性）
- 眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。（刺激性）
- 散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しない。
- 散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意する。

〔品目特性〕

- いもち病と紋枯病のイネの二大病害に対し、1回の水面施用で高い防除効果を発揮します。
- 優れた残効性を有し感染防止・まん延防止効果を示します。
- リンバーはさまざまな生育ステージの紋枯病菌に対し強力な抗菌活性を示し、これが高い防除効果として現れます。
また、優れた残効性を有するとともに、速効性や予防・治療（病斑進展阻止）効果も兼ね備えています。
- コラトップ、リンバーともイネ体への吸収移行性に優れています。その為粒剤として好適な組み合わせです。