

〔フェンピラザミン水和剤〕

農林水産省登録 第23298号
 性 状：褐色水和性細粒及び微粒
 毒 性：普通物
 危 険 物：—
 有効年限：5 年
 包 装：100 g × 60、250 g × 20

ピクシオ® D F

有効成分：フェンピラザミン……………50.0%



こちらのバーコードをスマートフォン等で読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の新しい情報をご覧いただけます。また、詳しい読み取り方・最新情報については11頁をご覧ください。

〔適用と使用法〕

作物名	適用病害名	希釈倍数	10アール当り 使用用量	使用時期*	総使用回数*	使用方法
トマト ミニトマト きゅうり なす	灰色かび病	2000 倍	100~300 ℓ	前日	4 回	散布
スイカ メロン	菌核病				3 回	
いちご	灰色かび病				4 回	
ぶどう かんきつ	灰色かび病		200~700 ℓ		3 回	
もも	灰星病		100~300 ℓ	発病初期	4 回	
花き類 観葉植物	灰色かび病					

⚠ 効果・薬害等の注意

- 薬液の調製は、まず本剤の所定量に少量の水を加えてかき混ぜ、その後所定量となるよう水を加え十分攪拌する。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布する。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節する。
- 施設で使用したあと、施設内に臭気が残る場合には換気を行う。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

⚠ 安全使用上の注意

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。かかった場合7日間は給桑しない。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 直射日光をさけ、食品と区別した、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

〔品目特性〕

- 灰色かび病・菌核病に高い効果を示します。
- 高い予防効果に加え、優れた治療効果（病斑進展阻止効果）を有します。
- 浸達性、浸透移行性に優れ、作物の内部に侵入した菌に対しても高い効果を発揮します。
- 既存薬剤に耐性を示す灰色かび病菌にも高い効果を示します。
- 製剤は粉立ちが少なく取扱いやすいDF（ドライフロアブル）です。水に溶けやすく、泡立ちも少ない製剤です。