

〔フェリムゾン・フサライド水和剤〕

農林水産省登録 第19165号
 性 状：類白色水和性粘稠懸濁液体
 毒 性：普通物
 危 険 物：—
 有効年限：500 ml：5年、5 ℓ：3年
 包 装：500 ml×20、5 ℓ×4

ブラシン®フロアブル

有効成分：フェリムゾン(PRTR・1種)…15.0% フサライド®(PRTR・1種)……………15.0%



こちらのバーコードをスマートフォン等で読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の新しい情報がご覧になれます。また、詳しい読み取り方・最新情報については11頁をご覧ください。

〔適用と使用法〕

作物名	適用病害名	希釈倍数	107-l当たり 使用液量	使用時期*	総使用回数*	使用方法
稲	いもち病	300倍	25ℓ	7日前	本 剤：2回 フェリムゾン：2回 フサライド：3回	散布
	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ（ごま葉枯病菌） 変色米 （カーブラリア菌） アルタナリア菌 エピコッカム菌） 褐条病 稲こうじ病 内穎褐変病 もみ枯細菌病 墨黒穂病	1000倍	60～ 150ℓ			

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 長期間貯蔵しておくとは分離するので、使用の際は容器をよく振って均一な状態に戻してから所定量を取り出す。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけすみやかに散布する。
- 褐条病を対象とした採種圃場での散布は、翌年の育苗箱中での本病の発生抑制を目的としているが、効果がやや劣ることがあるので、種子消毒処理を併用することが好ましい。
- いもち病防除を主体とし、その他の病害との同時防除に使用できるが、多発時の内穎褐変病の防除には効果が劣ることがあるので注意する。
- 希釈倍数 300 倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用する。
- たばこ、けいとう、幼植物のだいず・あずき・いんげんまめにはかからないように注意する。（薬害）
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないよう注意し、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

⚠ 安全使用上の注意



- 誤飲などのないよう注意する。
- 眼に入らないよう注意する。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。（刺激性）
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換する。

- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管する。

12頁記載の注意事項、(1)、(2)、(3)、(4)～Dも合わせてお読み下さい。

〔品目特性〕

- ブラシンはいもち病防除剤として、またいもち病と米の品質に影響を及ぼす穂枯れ性病害との同時防除剤として、低コスト・高品質米生産稲作時代に役立つ稲病害の優れた防除薬剤です。
- 広範囲の病原菌に高い活性：いもち病、ごま葉枯病菌をはじめ、米の品質に影響を及ぼす穂枯れ性病害（変色米、すじ葉枯病、褐変穂、紅変米、稲こうじ病）や、バクテリア病害（内穎褐変病、褐条病、もみ枯細菌病）等幅広く稲の主要病原菌に活性を示します。

美しい穂の仕上げをお手伝いします。

田植から収穫までにいろいろな病原菌がイネの生育や米の品質に悪い影響を与えています。ブラシ剤は、いもち病・ごま葉枯病をはじめ米の品質を低下させる穂枯れ性病害に幅広く作用して美しい穂に仕上げます。バクテリア病害「内穎褐変病」「褐条病」「もみ枯細菌病」にも登録取得しています。

- いもち病・穂枯れ・変色米・稲こうじ病・内穎褐変病・もみ枯細菌病に

…………… **ブラシン®**

