

[ペンチアバリカルブイソプロピル・マンゼブ水和剤]

農林水産省登録 第23185号
性 状：淡黄色水和性粉末 45μm以下
毒 性：普通物
危 険 物：—
有効年限：4年
包 装：500g×20袋

ベネセツト®水和剤

有効成分：ペンチアバリカルブイソプロピル … 3.75% マンゼブ …………… 70.0%

殺菌剤分類 40.M3



農薬ガイドの適用表内（＊）および各項目については、i-農力サイトの「製品情報」や「農薬ガイドを見る」から、「農薬ガイドの見方」をご参照ください。
本剤の最新情報：こちらの2次元バーコードを読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の最新情報がご覧になります。

[適用と使用方法]

作物名	適用病害名	希釈倍数	10アール当り 使用液量	使用時期*	総使用回数*	使用方法		
ぶどう	晩腐病 黒とう病 べと病	1000 倍	200～700 ℓ	45 日前	本剤：2回 ベンチアバリカルブイソプロピル：3回 マンゼブ：2回	散布		
きゅうり	褐斑病 べと病			前日	本剤：3回 ベンチアバリカルブイソプロピル：3回 マンゼブ：3回			
はくさい	べと病			30 日前	本剤：1回 ベンチアバリカルブイソプロピル：3回 マンゼブ：1回			
キャベツ					本剤：2回 ベンチアバリカルブイソプロピル：2回 マンゼブ：3回			
メロン		7 日前		本剤：5回 ベンチアバリカルブイソプロピル：5回 マンゼブ：5回				
すいか	褐色腐敗病			本剤：5回 ベンチアバリカルブイソプロピル：5回 マンゼブ：7回				
トマト	疫病			本剤：2回 ベンチアバリカルブイソプロピル：3回 マンゼブ：2回				
たまねぎ	べと病 白色疫病	750 ～1000 倍		100～300 ℓ	7 日前		本剤：3回 ベンチアバリカルブイソプロピル：3回 マンゼブ：5回	散布
ねぎ	べと病 黒斑病		14 日前		本剤：3回 ベンチアバリカルブイソプロピル：3回 マンゼブ：3回			
さといも	疫病	16 倍	1.6～3.2 ℓ		7 日前	本剤：2回 ベンチアバリカルブイソプロピル：2回 マンゼブ：2回	無人航空機による散布	
		1000 倍	100～300 ℓ			本剤：5回 ベンチアバリカルブイソプロピル：5回 マンゼブ：10回 (#1)	散布	
ばれいしょ								

色掛けは2024年8月28日適用拡大

作物名	適用病害名	希釈倍数	10アール当り 使用液量	使用時期*	総使用回数*	使用方法
かぼちゃ	疫病 べと病	1000 倍	100～300 ℓ	21 日前	本剤：2回 ベンチアバリカルブイソプロピル マニゼブ：3回 マンゼブ：2回	散布

#1：無人航空機散布は3回

 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節する。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさける。
- ボルドー液との7日以内の近接散布は薬害を生じるおそれがあるのでさける。
- 極端な高温多湿条件下では、軟弱幼苗に薬害のおそれがあるので注意する。
- あんずに対して薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合はかからないように注意する。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

 安全使用上の注意

- 無人航空機で散布する場合は次の注意を守る。
 - 散布は散布機種種の散布基準に従って実施する。
 - 散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用する。
 - 散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行う。
 - 散布薬液の飛散によって自動車の塗装などに被害を与えるおそれがある等、各分野に影響があるので、散布区域の諸物件に十分留意する。
 - 散布終了後、機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理する。また使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄する。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので目に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用する。
作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさける。
- 夏期高温時の使用をさける。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
- 高温下及び湿気を吸うと分解して効力が低下するので、直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

「[農業ガイドの見方](https://www.i-nouryoku.com/prod/search/) (https://www.i-nouryoku.com/prod/search/ 農業ガイドの見方.pdf)」の「3. 注意事項：(1)、(2)、(3)、(4)－F」も合わせてお読み下さい。

〔品目特性〕

- 予防と治療のダブルの効果
べと病菌、疫病菌の生活環の多くのステージに作用し、感染から発病に至る全ての過程を阻害します。
- 優れた耐雨性
浸達性に優れたベンチアバリカルブイソプロピルと付着性に優れたマンゼブの効果により優れた耐雨性を発揮します。
- 既存薬剤耐性菌にも安定した効果
既存の薬剤耐性菌にも安定した効果を示します。また、作用点の異なる2成分を混合することにより、薬剤耐性菌の発達リスクも回避できます。