

〔オキシリニック酸・ストレプトマイシン水和剤〕

農林水産省登録 第17963号

性 状：類白色水和性粉末 45 $\mu$ m以下

毒 性：普通物

危 険 物：—

有効年限：4 年

包 装：500 g  $\times$  20 袋

# アグロス マテリーナ<sup>®</sup> 水和剤

有効成分：オキシリニック酸……………10.0% ストレプトマイシン硫酸塩……………12.5%

(ストレプトマイシンとして……………10.0%)

補助成分：ホ<sup>®</sup>リ(オキシエチレン)ニルフェニルエーテル(PRTR・1種)…1.5%以下



マテリーナは Meiji Seika ファルマ(株)の登録商標

こちらのバーコードをスマートフォン等で読み取ると i-農力サイトに掲載されている本剤の新しい情報がご覧になれます。また、詳しい読み取り方・最新情報については11頁をご覧ください。

## 〔適用と使用方法〕

作物名	適用病害名	希釈倍数	10アール当り 使用液量	使用時期*	総使用回数*
はくさい	軟腐病	1000 倍	100~300 $\ell$	14 日前	本 剤：3回 オキシリニック酸：3回 ストレプトマイシン：3回
たまねぎ				7 日前	本 剤：5回 オキシリニック酸：5回 ストレプトマイシン：5回
こんにゃく	腐敗病			30 日前	本 剤：5回 オキシリニック酸：#1 ストレプトマイシン：#2
ばれいしょ	軟腐病			7 日前	本 剤：3回 オキシリニック酸：#3 ストレプトマイシン：#4
だいこん				30 日前	本 剤：2回 オキシリニック酸：5回 ストレプトマイシン：2回
ほおずき	斑点細菌病			—	—

#1：6回（種いもへの吹き付けは1回、植付後は5回）

使用方法：散布

#2：6回（種いもへの処理は1回）

#3：5回（種いも浸漬は1回）

#4：5回（種いもへの処理は1回）

## ⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- ボルドー液及び石灰、タルク、ベントナイトなどの吸着性増量剤を含有する薬剤との混用はさける。
- はくさいに使用する場合、幼苗期、高温時には薬害（クロロシス）を生じるおそれがあるので注意する。
- だいこんに使用する場合、高温時には薬害（クロロシス）を生じるおそれがあるので注意する。
- 本剤の連続使用によって薬剤耐性菌が出現し、効果の劣った事例があるので、過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と組合わせて輪番で使用する。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## 安全使用上の注意

- 誤飲、誤食などのないよう注意する。  
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。  
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。  
眼に入った場合には直ちに水洗する。
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。  
また散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。  
散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。  
12 頁記載の注意事項、(1)、(2)、(3)、(4) -C も合わせてお読み下さい。

### 〔品目特性〕

- オキシリニック酸（商品名：スターナ）とストレプトマイシンの混合剤です。
- 細菌病に対して予防効果と治療効果があります。