

〔フラメトピル水和剤〕

農林水産省登録 第21876号

性 状：類白色水和性細粒

毒 性：普通物

危 険 物：—

有効年限：5 年

包 装：500 g × 20

## リンバー®顆粒水和剤

有効成分：フラメトピル……………50.0%

殺菌剤分類 7



「住友化学農業ガイド」の見方：i-農カサイトの「製品情報」、「農業ガイドを見る」から、「農業ガイドの見方」をご覧ください。  
本剤の最新情報：こちらの2次元バーコードを読み取るとi-農カサイトに掲載されている本剤の最新情報をご覧いただけます。

## 〔適用と使用方法〕

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用用量	使用時期*	総使用回数*	使用方法
てんさい	根腐病	800倍	ペーパーポット 1冊当り1ℓ	定植前	本 剤：1回 フラメトピル：4回 (#1)	灌注
	根腐病 葉腐病	4000倍	100~300ℓ ／10a	7日前	本 剤：3回 フラメトピル：4回 (#1)	散布
ばれいしょ	黒あざ病	1000倍	—	植付前	本 剤：1回 フラメトピル：1回	瞬間~10分間 種いも浸漬
ねぎ	白絹病	4000倍	100~300ℓ ／10a	前日	本 剤：3回 フラメトピル：3回	株元 散布

#1：定植前の灌注は1回、散布は3回



## 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。



## 安全使用上の注意



- 誤飲、誤食などのないよう注意する。  
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。  
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 本剤は皮ふに対して刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意する。  
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 使用の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。  
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

(2023年3月14日現在の内容)

住友化学の農業支援サイト:i 農力<https://www.i-nouryoku.com/>

「[農業ガイドの見方](https://www.i-nouryoku.com/prod/search/) (<https://www.i-nouryoku.com/prod/search/> [農業ガイドの見方.pdf](#))」の「3. 注意事項：(1)、(2)、(3)、(4) - C」も合わせてお読み下さい。

## 〔品目特性〕

- てんさい根腐病・葉腐病などのリゾクトニア属菌に強力な活性を有し、実用防除場面で高い防除効果を示します。
- 発病初期までの予防散布が最も効果的ですが、治療（病斑進展阻止）効果も兼ね備えた薬剤です。
- 浸透移行性を有し、十分な残効性が期待できます。
- 耐雨性に優れ、効果が安定します。
- 水中崩壊性・水和性に優れ、「溶けやすさ」が魅力の製剤です。