

〔フラメトピル粒剤〕

農林水産省登録 第19366号

性状: 淡灰色細粒

毒性: 普通物

リンバー® 粒剤

危険物: ー

有効年限: 5年

包装: 3kg × 8袋

有効成分: フラメトピル ……………1.5%



こちらのバーコードをスマートフォン等で読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の新しい情報をご覧いただけます。また、詳しい読み取り方・最新情報については11頁をご覧ください。

〔適用と使用方法〕

作物名	適用病害名	10アール当り 使用量	使用時期*	総使用回数*	使用方法
稲	紋枯病 疑似紋枯症 〔褐色菌核病菌〕 〔赤色菌核病菌〕	3～4kg	30日前	本剤: 2回 フラメトピル: 2回 (#1)	散布

#1: 直播では種時又は移植時までの処理は1回



効果・薬害等の注意

- 散布にあたっては湛水状態（水深3cm以上）で播きむらのないよう均一に散布し、散布後少なくとも3～4日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしない。
- 漏水のはげしい水田では効果の劣る場合があるので使用をさける。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。



安全使用上の注意

- 皮ふに付着しないよう注意する。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。(刺激性)
- 眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。(刺激性)
- 散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので養魚田では使用しない。
- 散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意する。

〔品目特性〕

- イネ紋枯病及び疑似紋枯症に強力な抗菌活性を示します。
- 菌糸伸長・病原力阻害などの優れた作用特性を有しています。
- 速効性や予防・治療（病斑進展阻止）効果を有しています。
- 残効性に優れ、イネ体への吸収移行も速やかに行われるので、粒剤の水面施用でも高い効果を発揮します。
- 出穂期からその1ヶ月前程度の広い適期幅を有しています。