

〔ピラクロニル・プロピリスルフロンの水和剤〕

農林水産省登録 第22840号

性 状：淡褐色水和性粘稠懸濁液体

毒 性：普通物

危 険 物：—

有効年限：5 年

包 装：500 ml×20 本、2 l×6 本

メガゼータ®フロアブル

有効成分：ピラクロニル……………3.9% プロピリスルフロンの水和剤……………1.7%



こちらのバーコードをスマートフォン等で読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の新しい情報をご覧いただけます。また、詳しい読み取り方・最新情報については11頁をご覧ください。

〔適用と使用方法〕

作物名	適用雑草名	使用時期*	10アール 当り使用量	総使用回数*	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ エゾノサヤヌカグサ シズイ オモダカ クログワイ コウキヤガラ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後5日～ ノビエ3葉期 ただし、移植後 30日まで	500 ml	本 剤：1回 ピラクロニル：2回 プロピリスルフロンの水和剤：2回	原液湛水散布、水口施用又は無人ヘリコプターによる滴下
直播水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ3葉期 ただし、収穫 60日前まで			原液湛水散布又は無人ヘリコプターによる滴下

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用前に容器を軽く振る。
- 主要雑草に対する散布適期幅

ホタルイ	3葉期まで	エゾノサヤヌカグサ	2葉期まで
ウリカワ	3葉期まで	シズイ	草丈3cmまで
ヘラオモダカ	3葉期まで	オモダカ	発生始期まで
ミズガヤツリ	3葉期まで	クログワイ	発生始期まで
ヒルムシロ	発生期まで	コウキヤガラ	発生始期まで
セリ	再生前から再生始期まで	アオミドロ・藻類による表層はく離	発生前まで

○本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに、時期を失しないように散布する。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布するようにする。

- 散布の際は、水の出入りを止めて湛水状態（水深3～5cm）で、まきむらが生じないように均一に散布する。また、極端な浅水や深水での使用はさける。
- 水口施用の場合は入水時に本剤を水口に施用し、流入水と共に水田全面に拡散させる。処理後田面水が通常の湛水状態（湛水深3～5cm）に達したときに必ず水を止め田面水があ

ふれ出ないように注意する。

- 本剤を無人ヘリコプターで滴下する場合は次の注意を守る。
 - 滴下は使用機種の使用基準に従って実施する。
 - 滴下に当たっては散布装置のノズルを使用しない。
 - 作業中、薬液が漏れないように装置の十分な点検を行う。
 - 隣接する圃場に水稲以外の作物が栽培されている場合は無人ヘリコプターによる本剤の滴下は行わない。
 - 水源池、飲料水等に本剤が飛散、流入しないよう十分留意する。
 - 薬剤滴下に使用した装置は十分洗浄し、薬剤タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理する。
 - 本剤の滴下に使用した無人ヘリコプターの散布装置は、水稲以外の作物への薬剤散布には使用しない。
- 散布後3～4日間はそのまま湛水を保ち、田面を露出させないようにし、散布後7日間は落水、かけ流しはしない。また、入水は静かにおこなう。
- 浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平化及び植付作業はていねいにおこなう。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいにおこなう。
- 直播水稲で使用する場合、稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので注意する。
- 以下のような条件下では薬害が発生するおそれがあるので使用をさける。
 - 砂質土壌の水田及び漏水の大きな水田（減水深が2cm/日以上）。
 - 軟弱な苗を移植した水田。
 - 極端な浅植えの水田。
- 著しい多雨条件では除草効果が低下する場合がありますので使用はさしひかえる。
- 田植前に生育したミズガヤツリは、完全に防除してから使用する。
- オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く、遅い発生のもので十分な効果を示さない場合がありますので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用する。
- 散布田の田面水を他の作物に灌水しない。
- 本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これら作物の生育期に隣接田で使用する場合には十分に注意する。
- いぐさ栽培予定水田では使用しない。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。



安全使用上の注意



- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- 水産動植物（藻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 無人ヘリコプターによる滴下で使用する場合は、飛散しないよう特に注意する。
- 散布後は水管理に注意する。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管する。

〔品目特性〕

- プロピリスルフロンとピラクロニルの2成分配合により優れた速効性を発揮します。
- ノビエを含む一年生雑草及び多年生雑草・SU抵抗性雑草に有効です。
- メガゼータは1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボと3剤型勢揃い、使用者のニーズに合わせてご使用いただけます。