

〔ウニコナゾールP粒剤〕

農林水産省登録 第17815号

性 状：類白色細粒

毒 性：普通物

危 険 物：—

有効年限：4 年

包 装：3kg×8袋

□ ミ カ® 粒 剤

有効成分：ウニコナゾールP……………0.040%



こちらのバーコードをスマートフォン等で読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の新しい情報をご覧になれます。また、詳しい読み取り方・最新情報については11頁をご覧ください。

### 〔適用と使用方法〕

作物名	使用目的	10アール当り使用量	使用時期*	総使用回数*	使用方法
水 稲	節間短縮による倒伏軽減	2～3kg	出穂 25～10日前まで	本 剤：1回 ウニコナゾールP：2回 (#1)	湛水散布

#1：種子浸漬は1回、本田では1回

### ⚠ 効果・薬害等の注意

- 散布に当たっては水の出入りを止め、3～5cmの水深を保ち、散布むらのないように田面に均一に散布する。散布後少なくとも7日間は落水やかけ流しはしない。
- 黒ぼく土壌の水田で使用する場合は、効果が十分発揮されないことがあるので注意する。
- 重複散布や多量散布は、後作物に影響する場合がありますので使用量を厳守する。
- 本剤を使用した水田の土壌を野菜類の育苗用床土に使用することはさける。
- 本剤の使用に当たっては、土壌の条件や水管理などの栽培管理により効果が変動する場合がありますので、使用量、使用方法については、あらかじめ病害虫防除所等関係機関の指導を受ける。

### ⚠ 安全使用上の注意

- 誤食などのないよう注意する。  
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。  
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。  
また粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

### 〔品目特性〕

- トリアゾール系の薬剤です。
- ジベレリンの生合成阻害により、細胞の縦伸長を抑制します。
- 上位節間を短縮し倒伏を軽減します。
- 出穂前25日～10日の使用のため、天候等の影響による稲の生育に応じた散布ができます。
- 全面処理のほか、スポット処理もできます。