

〔展 着 剤〕

農林水産省登録 第19026号

性 状：淡黄色澄明液体

毒 性：普通物

サントクテン®80

危 険 物：—

有効年限：5 年

包 装：500 ml×20 本

有効成分：ポリオキシエチレンドデシルエーテル(PRTR・1種)…80.0%



こちらのバーコードをスマートフォン等で読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の新しい情報をご覧になれます。また、詳しい読み取り方・最新情報については11頁をご覧ください。

〔適用と使用方法〕

適用農薬名	作物名	薬液 10 ℓ 当り使用量	使用方法
有機銅剤・抗生物質剤 TPN剤・キャブタン剤 トリアジン剤等の殺菌剤 有機リン剤・カーバメート剤 デリス剤・除虫菊剤 カルタップ剤等の殺虫剤	稲、キャベツ、ねぎ類、さ といも等の薬液のつきにく い作物	2～3 ml (3000～5000 倍)	添加
殺虫剤、殺菌剤	果樹、野菜等の薬液のつ きやすい作物	1～2 ml (5000～10000 倍)	
殺虫剤、殺菌剤	果樹類 (休眠期散布)	2～3 ml	
接触型除草剤 (樹園地)	接触型除草剤 (樹園地) の 登録内容の作物 適用雑草名：一年生雑草	2～5 ml	
シアン酸塩 尿素系 プロマシル系 } 除草剤	非選択性茎葉処理型除草剤 の登録内容の作物 適用雑草名：一年生雑草	10 ml	

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきる。
- 除草剤加用の場合は 10 度以下の低温では効果が助長されにくく、高温ほど有効。
- 畑作、稲作用の除草剤には使用しない。
- 生育期散布において薬害を生じやすい薬剤 (カラセン) に本剤を添加すると薬害を助長するおそれがあるので使用をさける。

⚠ 安全使用上の注意

- 水産動植物 (魚類) に影響を及ぼすので、養魚田では使用しない。
 - 直射日光をさけ、低温な場所に密栓して保管する。
- 12 頁記載の注意事項、(1)、(2)、(3)、(4) -D も合わせてお読み下さい。

〔品目特性〕

- 付着力・浸透力にすぐれています。