


良質米穂肥のとおき



倒伏軽減剤入り穂肥

スミショート[®]

14

14-2-17
チッソ リンサン カリ
+
倒伏軽減剤
ウニコナゾールP 0.012%

荷姿：正味10kg 袋

1 短稈化による倒伏軽減

2 幼穂形成期施肥による安定多収

プラス

肥料農水省登録番号 生第74203号 農薬農水省登録番号 第18201号

スミショート／SUMISHORTは住友化学(株)の登録商標

販売店

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
scc GROUP



住友化学

〒104-8260 東京都中央区新川2丁目27番1号

お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト 農力 <https://www.i-nouryoku.com>



倒伏軽減剤の入った水稲用専用穂肥です

肥料及び農薬成分(%)

窒素全量	内アンモニア性窒素	可溶性りん酸	内水溶性りん酸	水溶性加里	ウニコナゾールP
14.0	9.0	2.0	1.0	17.0	0.012%

特長

- ① 倒伏軽減剤「ウニコナゾールP」を添加した水稲専用の穂肥です。節間の伸長を抑制し、倒伏を軽減します。
- ② 直播栽培や移植栽培の穂肥として、出穂25～10日前(幼穂形成期～減数分裂期)に施用することにより、良質米の安定多収に役立ちます。
- ③ コシヒカリ、あきたこまち、ひとめぼれなどの倒伏しやすい品種に適しています。
- ④ 粒ぞろいが良く、機械散布にも適しています。

使用方法

作物	使用時期	使用目的	使用量	本剤の使用回数	ウニコナゾールPを含む農薬の総使用回数	使用方法
水稲	出穂25～10日前※	節間短縮による倒伏軽減	7～10kg/10a	1回	2回以内 (種子浸漬は1回以内) 本田では1回以内)	湛水散布 無人航空機による散布

※: およそ幼穂形成期～減数分裂期です。

農林水産省登録番号 (肥料)生第74203号 (農薬)第18201号

施用例

例	基肥			穂肥		
	銘柄	N-P-K(%)	施用量(kg)	施肥時期	銘柄	施用量(kg)
1	えびす印燐安加里	10-14-13	20～40	出穂25日前	スミショート14	10
				出穂15～10日前	銀泉特号	0～15
2	SSRコシヒカリ用 ハイチッソ043	20-14-13	20～30	出穂25～10日前	スミショート14	7～10

使用上の注意



●本剤を無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意を守ってください。①散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。②専用の散布装置によって湛水散布をしてください。③事前に本剤の物理性に合わせて散布装置のメタリング開度を調整してください。④本剤の飛散によって他の植物に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、当該水田周辺部への飛散防止のため散布装置のインペラの回数を調整してください。⑤水源、飲料水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意してください。●散布に当たっては水の出入りを止め、3～5cmの水深を保ち、散布むらのないように田面に均一に散布してください。散布後少なくとも7日間は落水やかけ流しはしないでください。●本剤を黒ぼく土壌の水田で使用する場合は、効果が十分発揮されないことがあるので注意してください。●重複散布や多量散布は、後作物に影響する場合がありますので使用量を厳守してください。●本剤を使用した水田の土壌を野菜類の育苗用床土に使用することは避けてください。●本剤の使用に当たっては、土壌の条件や水管理などの栽培管理により効果が変動する場合がありますので、使用量、使用方法については、あらかじめ病害虫防除等関係機関の指導を受けてください。●誤食などのないよう注意してください。●誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の処置を受けてください。●本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の処置を受けてください。●使用の際には農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。●粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。●直射日光をさけるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

●スミショート14は農薬を含みます。使用量の上限を超えないようご注意ください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。