

米作りを変える。

楽一が変える。



チッソ リンサン カリ
27.0-10.0-7.0

側条施用にも好適!

米作りを変える。楽一® が変わる。

らくいち / 楽一 / RAKUICHIは住友化学(株)の登録商標

肥料及び農薬成分(15kg袋)

単位：%

窒素全量	内アンモニア性窒素	可溶性りん酸	内水溶性りん酸	水溶性加里	ウニコナゾールP
27.0	5.5	10.0	8.0	7.0	0.004

特 長

- ①基肥一発肥料です。**
追肥の必要がなく、基肥だけで収穫まで肥効が続きます。
- ②大変省力になります。**
追肥や穂肥診断の手間がなく、更に倒伏しにくいので、収穫時の手間が省けます。
- ③莖数を安定確保できます。**
初期の莖数確保が容易で、有効莖歩合を高めて穂数を安定的に確保できます。
- ④収量・品質の安定・向上がはかれます。**
稲の生育に最も適切な時期に肥料が効くため、登熟が進み、収量が安定し、粒張りや食味が向上します。

使用方法

作物	施用時期	使用目的	使用量(10a あたり)	総使用回数	使用方法
水稻	耕起～代かき時	節間短縮 による 倒伏軽減	22.5 ～ 30kg	2回以内 (種子浸漬は1回以内、 本田は1回以内)	全面施用 土壌混和
	田植え時		15 ～ 30kg		側条施用
	は種時				

農林水産省登録番号 (肥料)生第86575号 (農薬)第21559号

使用上の注意

- 重複散布や多量散布は、後作物に影響する場合がありますので使用量を厳守すること。
- 本剤を使用した水田の土壌を野菜類の育苗用床土に使用することは避けること。
- 本剤の使用に当たっては、土壌の条件や水管理などの栽培管理により効果変動する場合がありますので、使用量、使用方法については、あらかじめ病害虫防除所等関係機関の指導を受けること。
- 誤食などのないように注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
-  使用の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。また、粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないこと。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載事項以外には使用しないでください。
- 小児の手の届くところには置かないでください。
- 空袋などは圃場等に放置せず適切に処理してください。

● 詳しい使い方、施肥設計については農業技術指導機関または住友肥料取扱店にご相談ください。

販売店

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCA GROUP

 住友化学

〒104-8260 東京都中央区新川2丁目27番1号

お客様相談室  0570-058-669

農業支援サイト  <https://www.i-nouryoku.com>



Z-039.21-05.100(沢)