


倒伏から、大切な米を守る。 “ウニコナゾールP” 配合

基肥—発肥料「楽一®シリーズ」



\\ NEW /



窒素、リン酸、カリの3要素も、
土地・品種に適した配合で
選べるラインアップ。

収穫作業の省力化


安定多収の米作り

米質向上、くず米減少に期待

刈り取りやすい、丈夫な稲に育てる「楽一」シリーズ。

らくいち／楽一／RAKUICHIは住友化学(株)の登録商標

肥効イメージ(平坦地、コシヒカリの場合)



倒伏回避のため
幼穂形成期穂肥できず
→高度な施肥管理が必要

上記に加えて
分けつがとれにくい
→目標収量を目指しにくい

**稲の生育に合わせた
理想的な肥効を実現**

稲の倒伏状態の比較



銘柄別の適用表 容量:15kg/袋

銘 柄	N-P-K	ウニコナ ゾールP (%)	作 物	施 用 量 (kg/10a)				推 奨 地 域
				移 植		直 播		
				全 層	側条(田植え時)	全 層	側条(は播時)	
楽一21	21-11-10	0.0040	水 稻	22.5～30	15～30	22.5～30	22.5～30	北陸、関東平坦部、西南暖地 ※地力、施用方法に合わせて 銘柄を選定してください。
楽一18	18-12-12	0.0040		22.5～30	15～30	22.5～30	—	
楽一20S	20-11-11	0.0020		30～40	30～40	30～40	—	
楽一20W	20-12-12	0.0030		22.5～30	22.5～30	22.5～30	—	
楽一25	25-10-8	0.0040		22.5～30	15～30	22.5～30	—	東北、関東山間部、 西南暖地山間部
楽一27	27-10-7	0.0040		22.5～30	15～30	22.5～30	15～30	東北、3～4月田植え地域の 西南暖地
楽一28N	28-10-7	0.0030		20～40	20～40	20～40	20～40	

- ウニコナゾールPを含む農薬の総使用回数：2回以内(種子浸漬は1回以内、本田では1回以内)
 - 全層：全面施用土壌混和、施用時期：耕起～代かき時 ●側条：側条施用 ●—：適用なし
 - 主な推奨品種は「コシヒカリ・あきたこまち・ひとめぼれ」等の長稈性・良食味品種ですが、その他の水稻品種でもお使いいただけます。
- 楽一21 農林水産省肥料登録 生第86573号 農林水産省農薬登録 第21557号 楽一25 農林水産省肥料登録 生第86574号 農林水産省農薬登録 第21558号
楽一18 農林水産省肥料登録 生第90142号 農林水産省農薬登録 第22450号 楽一27 農林水産省肥料登録 生第86575号 農林水産省農薬登録 第21559号
楽一20S 農林水産省肥料登録 生第86572号 農林水産省農薬登録 第21560号 楽一28N 農林水産省肥料登録 生第101691号 農林水産省農薬登録 第23762号
楽一20W 農林水産省肥料登録 生第90143号 農林水産省農薬登録 第22451号

楽一を使った栽培のポイント

- 銘 柄：地域・地力・品種に合わせた銘柄を選定し、使用量、使用方法を守ってお使いください。
- 播 種 量：育苗時の一箱当たりの播種量は乾粒で**100~130g**が目安です。
地域、品種の情報を参考に加減してください。過剰な増量は苗の品質低下につながりますので注意してください。
- 植付本数：**1株3~5本**を目安とし、地域の品種・気象条件・圃場の地力に応じて加減し適正な茎数確保を目指しましょう。
- 水 管 理：有効分けつ確保後は、田面に軽くヒビが入る程度に中干しを行ないます。
土壌条件及び生育状態を考慮して行ない、**過度の中干しは避けましょう。**
- 詳しい使い方、施肥設計については農業技術指導機関等もしくは住友肥料販売店にご相談ください。

特約販売店



〒104-8260 東京都中央区新川二丁目27番1号
お客様相談室 ☎ 0570-058-669
農業支援サイト i-農力 <http://www.i-nouryoku.com>
HB-001.16-03.30,000(HP)