

果樹・野菜の害虫防除に

アグロスリン®

水和剤

広い
殺虫スペクトラム

優れた速効性

優れた残効性



適用拡大

作物追加

「さくら」の「クビアカツヤカミキリ」

害虫追加

「かんしょ」の「ハムシ類」、
「かんぎつ」の「ミカンバエ成虫」、
「おうとう」の「クビアカツヤカミキリ」等

※詳細は裏面でご確認ください。





アグロスリン®

水和剤

果樹・野菜の害虫に

農林水産省登録 第16583号 有効成分: シペルメトリン……6.0 %

殺虫剤分類 3A

適用作物・害虫と使用方法

*印は本剤およびシペルメトリンを含む農薬の総使用回数

2024年7月現在の登録内容(太字は2024年6月26日の適用拡大)

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用 液量	使用時期 (収穫前)	総使用 回数*	使用 方法	
キャベツ	アオムシ、コナガ、アブラムシ類 ヨトウムシ、タマナギンウバ	1,000～2,000	100～300 ℓ/10a	7日前まで	5回以内	散布	
	アザミウマ類	1,000					
はくさい	アオムシ、コナガ、アブラムシ類 ヨトウムシ、ハスモンヨトウ	1,000～2,000		前日まで			3回以内
	アザミウマ類	1,000		5回以内			
だいこん	アオムシ、コナガ、アブラムシ類 ヨトウムシ	1,000～2,000		7日前まで	2回以内		
はつかだいこん				3日前まで	1回		
なばな類		1,000		7日前まで	3回以内		
レタス	アブラムシ類	2,000			5回以内		
非結球レタス					2回以内		
ピーマン	アブラムシ類、タバコガ			前日まで	5回以内		
きゅうり なす	オンシツコナジラミ アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ	1,000			2回以内		
トマト	アブラムシ類	1,000～2,000					
ミニトマト	オンシツコナジラミ	2,000			7日前まで	5回以内	
すいか メロン	アブラムシ類	1,000～2,000					
たまねぎ	アザミウマ類	1,000		前日まで	散布、但し花穂の発 生期にはマルチフィル ム被覆により散布液 が直接花穂に飛散し ない状態で使用する		
みょうが(花穂)	アブラムシ類						
	アザミウマ類 ハスモンヨトウ			みょうが(花穂)の 収 穫 前 日 ま で 但 し、花 穂 を 収 穫 しない場合にあって は開花期終了まで			
みょうが(莖葉)	アブラムシ類	1,000～2,000				7日前まで	4回以内
ばれいしょ	ヨトウムシ	1,000～2,000		14日前まで			
かんしょ	ナカジロシタバ、ハスモンヨトウ			1,000～2,000	7日前まで	5回以内	散布
	アブラムシ類	1,000					
かんしょ (莖 葉)	イモコガ、エビガラスズメ コナジラミ類、ネギアザミウマ ヨトウムシ、ハムシ類	1,000		2回以内			
	ナカジロシタバ、ハスモンヨトウ	1,000～2,000					
かんしょ (莖 葉)	アブラムシ類	1,000～2,000		2回以内			
	イモコガ、エビガラスズメ コナジラミ類、ネギアザミウマ ヨトウムシ、ハムシ類	1,000					

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用 液量	使用時期 (収穫前)	総使用 回数*	使用 方法		
かんきつ	アブラムシ類、カメムシ類 チャノキイロアザミウマ、アケビコノハ、 ヒメエグリバ、ミカンバエ成虫	2,000	200～700 ℓ/10a	7日前まで	3回以内	散布		
りんご	アブラムシ類 ギンモンハモグリガ	1,000～2,000		前日まで	2回以内			
	キンモンホソガ シンクイムシ類	1,000～2,000						
	ハマキムシ類 モモチョッキリゾウムシ ヒメシロモンドクガ	1,000						
なし	ナシチビガ、アブラゼミ	1,000～2,000					3回以内	
	シンクイムシ類、カメムシ類 アブラムシ類、ハマキムシ類							
もも	モモハモグリガ、シンクイムシ類 アブラムシ類、カメムシ類 アカエグリバ、アケビコノハ オオエグリバ、ヒメエグリバ						1,000～2,000	5回以内
	クビアカツヤカミキリ	1,000						
	かき	カメムシ類、カキノヘタムシガ アザミウマ類					1,000～2,000	
ぶどう	フタデンヒメヨコバイ	1,000～2,000					21日前まで	5回以内
	コガネムシ類							
くり	チャノキイロアザミウマ	1,000～3,000					7日前まで	
	クリタマバチ	1,000						
おうとう	クリシギゾウムシ	1,000～3,000					3日前まで	2回以内
	カメムシ類、ショウジョウバエ類 オウトウハマダラミバエ クビアカツヤカミキリ	1,000						
うめ	アブラムシ類、モモヒメヨコバイ	2,000	7日前まで	3回以内				
すもも	シンクイムシ類、カメムシ類 クビアカツヤカミキリ	1,000	前日まで	2回以内				
ネクタリン	シンクイムシ類、 アブラムシ類、モモハモグリガ カメムシ類	1,000～2,000						
	クビアカツヤカミキリ	1,000						
くるみ	アメリカシロヒトリ	1,000～2,000		3回以内				
茶	チャノコカクモンハマキ チャノホソガ、チャハマキ	1,000	200～400 ℓ/10a	摘採14日前まで	1回			
	ヨモギエダシャク チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ	1,000～2,000						
さくら	クビアカツヤカミキリ	1,000	200～700 ℓ/10a	成虫発生初期	6回以内			