

使用上の注意事項(抜粋)



- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- かんきつ、茶での散布は、場合によりハダニ類が増えることがあるので注意してください。
- みずかけな(水掛菜)、カラー及び花はすに使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用后14日間は入水しないでください。
- ねぎのシロイチモジヨトウの防除に使用する場合は、食入前の若令幼虫期に散布してください。
- 無人航空機による散布に使用する場合は、無人航空機散布の注意を守ってください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合は吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 原液は眼に対して刺激性があるので、薬液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 原液は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 使用の際は、農薬用マスク、手袋などを着用してください。また、薬液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ① ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
 - ② 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - ③ 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着するおそれのある場所では使用しないでください。
- 水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

アディオ[®] 乳剤

作物いろいろワイドにまもる

ただいま登録作物 **70種以上!**

適用拡大

害虫追加
「はくさい」の「ハクサイダニ」
使用方法
「にんにく」の「アブラムシ類」に
「無人航空機による散布」

※詳細は裏面でご確認ください。



- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 小児の手の届く所には置かないでください。
- 空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。



適用作物・害虫と使用方法

2023年6月現在の登録内容(太字は2023年6月7日適用拡大)

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
なし	アブラムシ類、シンクイムシ類	2,000~3,000	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布
	ハマキムシ類、カメムシ類	2,000				
もも	カメムシ類	2,000				
	シンクイムシ類、アブラムシ類	2,000~3,000		収穫7日前まで	6回以内	
	モモハモグリガ	2,000~4,000				
かき	ハマキムシ類	3,000				
	カキノハタムシガ、カメムシ類	2,000~3,000				
キウイフルーツ	チャノキイロアザミウマ	2,000				
	カイロマイコガ	2,000~3,000				
くり	カメムシ類	2,000		羽化脱出期 但し収穫 14日前まで	5回以内	
	クリタマバチ	1,000~2,000				
かんきつ	クリシギゾウムシ	2,000	収穫14日前まで	6回以内		
	ミカンハモグリガ、アブラムシ類	2,000~4,000				
	チャノキイロアザミウマ	2,000~3,000				
いちじく	アザミウマ類、アブラムシ類	2,000	収穫前日まで	2回以内		
	イチジクヒトリモドキ	3,000				
アロニア	シンクイムシ類	3,000	収穫14日前まで	2回以内		
はまなす(果実)	キイロマイコガ	2,000	収穫7日前まで	3回以内		
ざるなし	カメムシ類	2,000				
ネクタリン	シンクイムシ類、アブラムシ類	2,000~3,000				
	モモハモグリガ	2,000~4,000				
きゅうり	オンシツコナジラミ	2,000~3,000	収穫前日まで	6回以内 [乳剤は3回以内、 粒剤は3回以内]		
ズッキーニ	アブラムシ類、フキノメイガ	2,000~3,000				
にがうり	カメムシ類、ヨトウムシ類、タバコカスミカメ	2,000~3,000	収穫前日まで	3回以内		
すいか	アブラムシ類	2,000~3,000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	5回以内	
メロン						
かぼちゃ						
いちご	3,000					
ごぼう	ヨトウムシ	2,000	収穫7日前まで	3回以内		
だいず	フタスジヒメハムシ、マメハンミョウ	3,000				
	うめ	ツメクサガ、ウコンノメイガ、カメムシ類	3,000	0.8ℓ/10a	無人航空機 による散布	
ピーマン	アブラムシ類	2,000~3,000	200~700ℓ/10a	2回以内		
とうがらし類	タバコガ、カメムシ類	2,000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	5回以内	
	タバコガ	2,000		収穫7日前まで	2回以内	
キャベツ	アブラムシ類	2,000~3,000	0.5ℓ/m ²	収穫21日前まで	5回以内 (株元灌注は2回以内)	
	ネキリムシ類	4,000~8,000		収穫3日前まで		
はくさい	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	2,000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	5回以内	
だいこん	ヨトウムシ、 ハクサイダニ	2,000		収穫30日前まで	4回以内	
	かぶ	アオムシ	2,000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	※1
茎ブロッコリー	アオムシ	2,000	収穫7日前まで		3回以内	
ブロッコリー	コナガ	2,000~3,000	100~300ℓ/10a	収穫3日前まで	5回以内	
カリフラワー	アブラムシ類	2,000~3,000		収穫前日まで	※2	
レタス	アブラムシ類、ヨトウムシ	2,000~3,000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	
非結球レタス	アブラムシ類	2,000~3,000		収穫7日前まで	5回以内	
トレビス	アブラムシ類	3,000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	
たまねぎ	ハスモンヨトウ、アザミウマ類、ネギコガ	3,000				
ねぎ	アザミウマ類、ネギコガ	2,000				
	シロイチモジヨトウ	2,000				
にんにく	ネギコガ、アブラムシ類	2,000~3,000	1.6ℓ/10a	収穫前日まで	4回以内 [乳剤は2回以内、 粒剤は2回以内]	
	アブラムシ類	32~48倍		無人航空機 による散布		

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
ハスカップ	ハマキムシ類、アブラムシ類	2,000~3,000	200~700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	
アスパラガス	ジュウシホシクビナガハムシ、カメムシ類	2,000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内 [乳剤は2回以内、 粒剤は2回以内]	
さやいんげん	ヨトウムシ、アブラムシ類	2,000				
	カメムシ類	2,000				
未成熟そらまめ	アザミウマ類、アブラムシ類 ハモグリバエ類、ヨトウムシ類 ウラナミシジミ、アズキノメイガ マメシンクイガ	3,000		100~300ℓ/10a		収穫14日前まで
豆類 [未成熟、但し、 さやいんげん、 さやえんどう、 未成熟そらまめ、 えだまめを除く]						収穫7日前まで
えだまめ						収穫14日前まで
えだまめ	ウコンノメイガ、ツメクサガ	4,000		100~300ℓ/10a		収穫前日まで
さやえんどう	フタスジヒメハムシ、マメハンミョウ					収穫前日まで
ほうれんそう	ナモグリバエ、ヨトウムシ類	2,000		100~300ℓ/10a		収穫14日前まで
しゅんぎく	ウラナミシジミ					収穫21日前まで
しそ	アブラムシ類、ハクサイダニ	4,000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで		
オクラ	ハスモンヨトウ、アブラムシ類、カメムシ類			2回以内		
トマト	アブラムシ類、アブラムシ類	2,000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	
ミニトマト	オンシツコナジラミ、アブラムシ類	2,000~3,000		※3		
なす	アブラムシ類	2,000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	
なばな類	オンシツコナジラミ、カメムシ類					
ばれいしょ	テントウムシダマシ類	2,000~3,000	100~300ℓ/10a	収穫14日前まで	4回以内	
とうもろこし	アオムシ	2,000				
あずき	アワノメイガ	2,000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	
やまのいも	アブラムシ類、アザミウマ類、ヤマノイモコガ	2,000~3,000				
さといも	アブラムシ類	3,000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	5回以内	
さといも(葉柄)	アズキノメイガ	2,000				
かんしょ	アブラムシ類	3,000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	
茶	イモコガ	3,000				
そらまめ	アオムシ	2,000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	
非結球あぶらな科葉菜類 (こまつな、非結球はくさい、 みずな、なばな類を除く)	アオムシ	2,000				
こまつな	ハクサイダニ	2,000~4,000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	
非結球はくさい	アオムシ					
みずな	アブラムシ類、ダイコンハムシ	3,000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	
つるむらさき	アオムシ	2,000				
食用ゆり	アブラムシ類	3,000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	5回以内	
食用亜麻	ヨトウガ	2,000				
葉ごぼう	アブラムシ類	3,000	100~300ℓ/10a	収穫14日前まで	2回以内	
ごま	アブラムシ類、カメムシ類	2,000				
はこべ	オオタバコガ	3,000	100~300ℓ/10a	収穫3日前まで	3回以内	
花き類・観葉植物 (はばたんを除く)	アブラムシ類	2,000~4,000		収穫21日前まで	1回	
はばたん	カメムシ類、ハマキムシ類、ヨトウムシ類	2,000	100~300ℓ/10a	発生初期	6回以内	
樹木類(くちなしを除く)	アオムシ	2,000~4,000				
くちなし	アブラムシ類	2,000~4,000	100~300ℓ/10a	発生初期	6回以内	
アザミウマ類	2,000					

*印は本剤及びベルメトリンを含む農業の総使用回数 ※1:本剤は2回以内、ベルメトリンを含む農業の総使用回数は4回以内(散布は2回以内)
※2:本剤は2回以内、ベルメトリンを含む農業の総使用回数は4回以内(乳剤は2回以内、粒剤は2回以内)
※3:本剤は3回以内、ベルメトリンを含む農業の総使用回数は4回以内(株元散布は1回以内、散布及び噴射は合計3回以内)