

この一成分で 抵抗性害虫にも 幅広い防除効果。 新時代の 農薬、登場!

アレスは既存の殺虫剤とは異なり、
これまでにない化学構造をもつ新しい化合物です。
多様な害虫に優れた効果を発揮します。



**有効成分が
幅広い害虫に**

Oxazosulfyl
オキサゾスルフィル

- 既存の殺虫剤に抵抗性を持った害虫にも効く
- 幅広い害虫に高い効果を発揮
- 育苗時の使用で効き目長持ち
- 稲に対する薬害リスクが低い

さまざまな害虫に効く



トビイロウンカ

ヒメトビウンカ

コブノメイガ

ニカメイチュウ

イネドロオイムシ

イネミズゾウムシ

コバネイナゴ



水稻育苗箱用殺虫剤

アレス® 箱粒剤

動画公開中▼



アレス[®] 箱粒剤

殺虫剤分類 UN

有効成分：オキサズルスフィル…2.0%

特長

- ① 既存の殺虫剤に抵抗性を持つ害虫にも高い効果
- ② 1成分で幅広い害虫に優れた効果
- ③ 播種前（床土混和・覆土混和）から移植時まで使用可能

有効成分が
幅広い害虫に
Oxazosulfyl
オキサズルスフィル

2023年9月現在の登録内容

適用害虫および使用方法


作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキサズルスフィルを含む 農薬の総使用回数
稲	イネドロオイムシ イネミズゾウムシ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	1kg/10a	移植時	1回	側条施用	1回
稲 (箱育苗)	イナゴ類 ウンカ類 イネツトムシ イネドロオイムシ イネヒメハモグリバエ イネミズゾウムシ コブノメイガ ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	育苗箱(*)1箱当り50g	は種前		育苗箱の床土 または覆土に 均一に混和する	
		高密度には種する場合は1kg/10a (育苗箱(*)1箱当り50～100g)				
		育苗箱(*)1箱当り50g	は種時 (覆土前) ～移植当日		育苗箱の 上から均一に 散布する	
		高密度には種する場合は1kg/10a (育苗箱(*)1箱当り50～100g)				
	カメムシ類 イネカラバエ	育苗箱(*)1箱当り50g	移植当日			
		高密度には種する場合は1kg/10a (育苗箱(*)1箱当り50～100g)				

*: 30×60×3cm、使用土壌約 5L

試験成績


■ウンカ類（ヒメトビウンカ）

試験場所：熊本県農業研究センター
生産環境研究所（2017年）
品 種：森のくまさん
播 種 日：5月19日
移 植 日：6月15日
処理時期：移植当日
発生状況：中発生
調 査 日：8月5日（移植51日後）、
8月20日（移植66日後）、
9月6日（移植83日後）
調査方法：回復あたり30株（2反復）に
ついて粘着板での払落し法
で虫数を調査。




■コブノメイガ

試験場所：兵庫県植物防疫協会（2016年）
品 種：ヒノヒカリ
移 植 日：6月10日
処理時期：移植当日
発生状況：少発生
調 査 日：8月9日（移植60日後）、
8月16日（移植67日後）、
8月28日（移植79日後）
調査方法：計900株の上位2葉について
被害葉数を調査。




■イネドロオイムシ

試験場所：日本植物防疫協会
山梨試験場（2017年）
品 種：コシヒカリ
播 種 日：4月28日
移 植 日：5月18日
処理時期：移植当日
(対照剤は播種時覆土前)
発生状況：少発生
調 査 日：6月22日（移植35日後）、
6月29日（移植42日後）、
7月6日（移植49日後）
調査方法：計800株について虫数を調査。



■イナゴ類（コバネイナゴ）

試験場所：日本植物防疫協会
岡山試験地（2017年）
品 種：にこまる
播 種 日：5月28日
移 植 日：6月20日
処理時期：移植当日
発生状況：中発生
調 査 日：7月13日（移植23日後）、
7月19日（移植29日後）
調査方法：7月13日は計400株について、
7月19日は計300株について
見取り調査。



注意事項

〈薬効・薬害等の注意〉

- 本剤を床土または覆土に混和する場合、処理後速やかに使用してください。また、本剤を処理した床土または覆土を放置しないでください。
- 育苗箱の上から均一に散布し、葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水して田植機にかけて移植してください。
- 育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当りに乾初として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が1kg/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの薬量を50から100gまでの範囲で調整してください。
- 側条施用する場合は、粒剤が均一に散布できる施用装置を装着した田植機を使用してください。
- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗等には薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
- 本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきをはいていに行い、移植後田面が露出しないように注意してください。

- 薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように処理してください。また、土壌全面に不透水性無孔シートを敷くなど、薬剤処理後の灌水による土壌への浸透をさけてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

〈安全使用上の注意〉

- 使用の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。 ●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

05R9I23A17:HP

2023年9月作成

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCA GROUP

住友化学

動画
チャンネルは
こちら！

〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号
お客様相談室 ☎ 0570-058-669
農業支援サイト 農薬力 <https://www.l-nouryoku.com>
住友化学アグロ事業部

