

長年の信頼と実績

スミチオン[®] 乳剤

®は住友化学(株)の登録商標です。



ホウレンソウケナガコナダニ



ホウレンソウケナガコナダニ被害



ワタアブラムシ



モモアカアブラムシ

ホウレンソウを
害虫から守る



特長


- 有機リン系殺虫剤でアセチルコリンエステラーゼの正常な活動を阻害し、殺虫効果を示します。
- 害虫に対し接触・食毒効果に優れ、植物に対し浸達性があります。
- 難防除害虫であるハウレンソウケナガコナダニに対し優れた効果を示します。

適用害虫と使用方法〈抜粋〉

2014年4月現在の登録内容

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	MEPを含む農薬の総使用回数	使用方法
ほうれんそう	アブラムシ類	1000~2000	100~300 ℓ/10a	収穫21日 前まで	2回以内	2回以内	散布
	ハウレンソウケナガコナダニ	2000					

スミチオン2回散布体系による ハウレンソウケナガコナダニに対する効果



実施年：平成23年
 試験場所：宮城県農業・園芸総合研究所
 供試植物：ハウレンソウ（品種：クロノス）
 発生状況：少発生（放虫）
 区制・反復：1区4.2m²、3反復
 処理日：5月2日、9日
 処理方法：肩掛け散布器（200~300ℓ/10a）
 調査日：5月2日、9日、12日、16日
 調査方法：各区から任意の15株に寄生する虫数を調査し、寄生株率を求めた



⚠️ 使用上の注意事項〈抜粋〉 詳細はラベルをご参照ください。

効果・被害等の注意

- ほうれんそうに使用する場合は、幼苗期には被害を生ずるおそれがあるので注意してください。
- あぶらな科作物には、被害を生ずるおそれがあるので付近にある場合にはかからないように注意して散布してください。
- ボルドー液と混用する場合は散布直前に行い、できるだけ早く使用してください。ただし、その他のアルカリ性の強い農薬との混用はさけてください。
- 本剤は自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意してください。
- 使用量に合わせて薬液を調製し、使い切ってください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に被害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

安全使用上の注意

- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
 - 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の果樹園等では使用をさける。
 - 養蜂が行われている地区では周辺への飛散に注意する等、ミツバチの危害防止に努める。
- 誤飲などのないように注意してください。
- 眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。（刺激性）
- 皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください。（刺激性）
- 使用の際は農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン、長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗顔・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

26H4D14S116:Z

2014年4月作成(全農教)

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCC GROUP

住友化学

住友化学株式会社
お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト i-農力 <http://www.i-nouryoku.com>