

水稻用初・中期一発処理除草剤

レオゼータ[®]

1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ

狙われたら、もう終わり。

フェンキトリオン
プロピリスルフロン
プロモブチド

3成分



エフィーダ[®]配合
問題雑草に広く効く!!



本剤は(公財)日本植物調節剤研究協会での
A1S区分・難防除雑草一発処理(オモダカ・ク
ログワイ・コウキヤガラ)で判定を取得しています。


◆ノビエ4葉期に卓効 ◆SU抵抗性雑草、多年生難防除雑草に優れた効果



ノビエ



オモダカ



ホタルイ



コナギ



クログワイ



コウキヤガラ



ミズアオイ

レオゼータ1キロ粒剤の適用と使用方法

農林水産省登録 第24697号

【有効成分】 フェンキノトリオン…3.0%
プロピリスルフロ…0.90% プロモブチド…9.0%

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ ウリカワ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ ヒルムシロ、セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植時	1kg /10a	1回	田植同時 散布機で施用
		移植直後～ノビエ4葉期 ただし、 移植後30日まで			湛水散布
直播水稻	一年生雑草 及び ホタルイ、ミズガヤツリ ウリカワ、ヒルムシロ、セリ	稲1葉期～ノビエ4葉期 ただし、 収穫90日前まで			

主要雑草に対する使用適期

ホタルイ ヘラオモダカ ウリカワ	3葉期まで
ミズガヤツリ	草丈20cm以下まで
ヒルムシロ	発生盛期まで
オモダカ	発生始め
クログワイ	草丈10cmまで
コウキヤガラ	草丈15cmまで
セリ	再生期まで

レオゼータフロアブルの適用と使用方法

農林水産省登録 第24700号

【有効成分】 フェンキノトリオン…5.6%
プロピリスルフロ…1.7% プロモブチド…16.7%

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ ウリカワ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ ヒルムシロ、セリ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後3日～ノビエ4葉期 ただし、 移植後30日まで	500mℓ /10a	1回	原液湛水散布
		稲1葉期～ノビエ4葉期 ただし、 収穫90日前まで			
直播水稻	一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ ウリカワ、ヒルムシロ、セリ アオミドロ・藻類による表層はく離				

主要雑草に対する使用適期

ホタルイ ヘラオモダカ	3葉期まで
ウリカワ	2葉期まで
ミズガヤツリ	草丈10cm以下まで
ヒルムシロ	発生盛期まで
オモダカ	発生始めまで
クログワイ	草丈10cmまで
コウキヤガラ	草丈15cmまで
セリ	再生期まで

レオゼータジャンボの適用と使用方法

農林水産省登録 第24698号

【有効成分】 フェンキノトリオン…10.0%
プロピリスルフロ…3.0% プロモブチド…30.0%

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ ウリカワ、オモダカ、クログワイ、 コウキヤガラ、ヒルムシロ、セリ	移植後3日～ノビエ4葉期 ただし、 移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (300g) /10a	1回	水田に 小包装(パック) のまま 投げ入れる

主要雑草に対する使用適期

ホタルイ ヘラオモダカ ウリカワ	3葉期まで
ミズガヤツリ	草丈20cm以下まで
ヒルムシロ	発生盛期まで
オモダカ	発生始めまで
クログワイ	草丈10cmまで
コウキヤガラ	草丈15cmまで
セリ	再生期まで

有効成分の総使用回数
(3剤型共通)

フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数	2回以内	プロピリスルフロを含む農薬の総使用回数	2回以内	プロモブチドを含む農薬の総使用回数	2回以内
----------------------	------	---------------------	------	-------------------	------

(上記の内容はすべて2024年1月現在の登録内容)

使用上の注意事項

【3剤型共通の使用上の注意事項】

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの4葉期までに、時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布するようにしてください。
- 以下のような条件下では薬害が発生するおそれがあるので使用をさけてください。
①砂質土壌の水田および漏水の大きな水田(減水深が2cm/日以上)
②軟弱な苗を移植した水田 ③極端な浅植えの水田および浮き苗の多い水田
- 稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので使用しないでください。
- 著しい多雨条件では除草効果が低下する場合があるので使用しないでください。
- 田植前に生育したミズガヤツリは、完全に防除してから使用してください。
- 本剤はその殺草特性から、いくさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これら作物の生育期に隣接田で使用する場合には十分に注意してください。
- いくさ栽培予定水田では使用しないでください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【1キロ粒剤・フロアブルの使用上の注意事項】

- 散布の際は、水の出入りを止めて湛水状態(水深3～5cm)で、まきむらが生じないように均一に散布してください。また、極端な浅水や深水での使用はさけてください。
- 散布後3～4日間はそのまま湛水を保ち、田面を露出させないようにし、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。また、入水は静かに行ってください。
- 浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平化及び補付作業はていねいに行ってください。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行ってください。
- 散布田の田面水を他の作物に灌水しないでください。

【1キロ粒剤の使用上の注意事項】

- 使用の際は農業用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。
- 夏期高温時の使用をさけてください。
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

【フロアブルの使用上の注意事項】

- 使用前には容器をよく振ってください。
 - 散布の際は不浸透性手袋、長スボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
 - かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
 - 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。
- 【ジャンボの使用上の注意事項】
- 藻類または表層はく離の発生しやすい水田では、有効な剤との組み合わせで使用してください。
 - 苗の植え付けが均一になるよう、代かき、均平化および補付作業はていねいに行ってください。未熟有機物を施用した場合は特にていねいに行ってください。
 - 処理に当っては、水の出入りを止めて5～6cmの湛水状態に保ってください。処理後、少なくとも3～4日間は通常の湛水状態を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしないようにし、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。自然減水により田面の一部が露出するようになったら、水尻を止めて通常の水深になるまで水を入れて水口を閉じてください。
 - 本剤は小包装(パック)のまま、10アール当り10個の割合で水田に均等に投げ入れてください。
 - 藻や浮き草が多発している水田では拡散が不十分となり、部分的な薬害や効果不足の可能性があるので使用をさけてください。
 - バックに使用しているフィルムは水溶性なので、濡れた手で作業したり、降雨で破袋することがないように注意してください。
 - 本剤を使用した水田の田面水は、他作物の灌水に用いないでください。
 - 濡れた手で触らないでください。
 - 水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意してください。
①眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
②かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。付着した場合には直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
 - 空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
 - 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。
 - 吸湿性があるので湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を強く閉じて保管してください。
 - 袋の中身のバックは強く圧するとフィルムが破れるおそれがあるので注意してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

06R1A24L01:ZS

2024年1月作成

大地のめぐみ、まっすぐくへ
scc GROUP



動画
チャンネルは
こちら！

〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号
お客様相談室 ☎ 0570-058-669
農業支援サポート ☎ 農力 https://www.1-nouryoku.com

住友化学アグロ事業部

住友化学

