

果樹・野菜の害虫防除に

アディオーン[®]

乳剤

作物いろいろワイドにまもる

ただいま登録作物 **70種以上!**

適用拡大

害虫追加

「ブロッコリー」、「ねぎ」の
「ネキリムシ類」等

使用方法

「だいず」の「カメムシ類」に
「無人航空機による散布」等

※ 詳細は裏面でご確認ください。





適用作物・害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法		
なし	アブラムシ類、シンクイムシ類	2,000~3,000	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布		
	ハマキムシ類、カメムシ類	2,000						
もも	カメムシ類	2,000~4,000		200~700ℓ/10a	収穫7日前まで		6回以内	散布
	モモハモグリガ							
	シンクイムシ類、アブラムシ類							
かき	ハマキムシ類	2,000~3,000		200~700ℓ/10a	収穫7日前まで		5回以内	散布
	カキノヘタムシガ、カメムシ類、チャノキイロアザミウマ							
キウイフルーツ	カキクダアザミウマ	2,000		200~700ℓ/10a	収穫7日前まで		5回以内	散布
	キイロマイコガ							
くり	カメムシ類	2,000		200~700ℓ/10a	羽化脱出期但し 収穫14日前まで		6回以内	散布
	クリタマバチ							
かんきつ	クリシギゾウムシ	1,000~2,000	200~700ℓ/10a	収穫14日前まで	6回以内	散布		
	ミカンハモグリガ、アブラムシ類							
いちじく	チャノキイロアザミウマ	2,000~3,000	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布		
	カメムシ類							
アロニア	アザミウマ類、アブラムシ類	2,000	200~700ℓ/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布		
はまなす(果実)	イチジクヒトリモドキ							
ざるなし	シンクイムシ類	3,000	200~700ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布		
	キイロマイコガ							
ネクタリン	カメムシ類	2,000	200~700ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布		
	シンクイムシ類、アブラムシ類、ハマキムシ類							
きゅうり	モモハモグリガ	2,000~4,000	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	*1	散布		
	オンシツコナジラミ、アブラムシ類、ウリハムシ							
ズッキーニ	アブラムシ類、フキノメイガ	2,000~3,000	200~700ℓ/10a	収穫7日前まで	*1	散布		
にがうり	カメムシ類、ヨトウムシ類、タバコカスミカメ							
すいか	アブラムシ類	3,000	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	5回以内	散布		
							メロン	
かぼちゃ	アブラムシ類	2,000~3,000	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	5回以内	散布		
いちご	ヨトウムシ							
ごぼう	ヨトウムシ	2,000	200~700ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布		
	だいず	フタスジヒメハムシ、マメハンミョウ、ツメクサガ ウコンノメイガ、カメムシ類、マメシンクイガ、アブラムシ類						
うめ	マメシンクイガ、アブラムシ類、カメムシ類	24	0.8ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機 による散布		
	アブラムシ類	3,000	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布		
ピーマン	アブラムシ類	2,000~3,000	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	5回以内	散布		
	タバコガ、カメムシ類							
とうがらし類	タバコガ	2,000	200~700ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布		
	アブラムシ類							
キャベツ	ネキリムシ類	4,000~8,000	0.5ℓ/m ²	収穫21日前まで	*2	株元灌注		
	アオムシ、コナガ、アブラムシ類 ヨトウムシ、タマナギンウワバ	2,000	100~300ℓ/10a	収穫3日前まで	5回以内	散布		
はくさい	アオムシ、コナガ、アブラムシ類 ヨトウムシ、ハクサイダニ							
だいこん	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ	2,000~3,000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布		
	ハイマダラノメイガ、ダイコンハムシ							
かぶ	アブラムシ類	2,000	100~300ℓ/10a	収穫30日前まで	*3	散布		
茎ブロッコリー	アオムシ							
ブロッコリー	アオムシ	2,000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布		
	コナガ							
カリフラワー	アブラムシ類	2,000~3,000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	5回以内	株元灌注		
	ネキリムシ類							
レタス	ネキリムシ類	8,000	0.5ℓ/m ²	収穫7日前まで	*4	散布		
	コナガ							
非結球レタス	アブラムシ類、ヨトウムシ	2,000~3,000	100~300ℓ/10a	収穫3日前まで	*4	散布		
トレビス	アブラムシ類							
たまねぎ	アブラムシ類	3,000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布		
ねぎ	ハスモンヨトウ、アザミウマ類、ネギコガ	2,000~3,000		100~300ℓ/10a	収穫7日前まで		5回以内	
	アザミウマ類、ネギコガ							
にんにく	シロイチモジヨトウ	2,000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	株元灌注		
	ネキリムシ類							
にんにく	ネギコガ、アブラムシ類	2,000~3,000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	*4	散布		
	アブラムシ類							
		32~48倍	1.6ℓ/10a			無人航空機 による散布		

果樹・野菜の害虫防除に

農林水産省登録 第15957号 [有効成分] ベルメトリン・20.0%

殺虫剤分類 3A

2024年6月現在の登録内容(太字は2024年5月29日適用拡大)

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
ハスカップ	ハマキムシ類、アブラムシ類	2,000~3,000	200~700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布
アスパラガス	ジュウシホシクビナガハムシ、カメムシ類 ヨトウムシ、アブラムシ類			2,000	収穫前日まで	
さやいんげん	カメムシ類	3,000	収穫14日前まで	3回以内		
未成熟そらまめ	アザミウマ類、アブラムシ類 ハモグリバエ類、ヨトウムシ類 ウラナミシジミ、アズキノメイガ マメシクイガ		収穫7日前まで			
豆類 [未成熟、但し、 さやいんげん、 さやえんどう、 未成熟そらまめ、 えだまめを除く]			ウコンノメイガ、ツメクサガ フタスジヒメハムシ、マメハンミョウ	収穫14日前まで		
えだまめ				収穫前日まで		
さやえんどう	ナモグリバエ、ヨトウムシ類 ウラナミシジミ	4,000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	
ほうれんそう	アブラムシ類、ハクサイダニ		収穫14日前まで 収穫21日前まで	*4		
しゅんぎく	ハスモンヨトウ、アブラムシ類 アザミウマ類、コナジラミ類 ウリハムシモドキ	2,000	収穫前日まで	3回以内		
しそ	オンスツコナジラミ、アブラムシ類	2,000~3,000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	*5	
オクラ	アブラムシ類	2,000		収穫前日まで	3回以内	
トマト	アブラムシ類	2,000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	
ミニトマト	アブラムシ類			3回以内		
なす	アブラムシ類	2,000~3,000	100~300ℓ/10a	収穫14日前まで	4回以内	
なばな類	アブラムシ類、アザミウマ類、ヤマノイモコガ			2,000	3回以内	
ばれいしょ	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	5回以内	
とうもろこし	アブラムシ類	2,000		2回以内		
あずき	アブラムシ類	2,000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	5回以内	
やまのいも	アブラムシ類	2,000		2回以内		
さといも	アブラムシ類、スズメガ類	2,000	100~300ℓ/10a	発生初期	6回以内	
さといも(葉柄)	アブラムシ類	2,000		1回		
かんしょ	イモコガ	2,000	100~300ℓ/10a	発生初期	6回以内	
茶	チャノコカクモンハマキ チャノミドリヒメコバイ チャノホソガ、チャノキイロアザミウマ	2,000~3,000		200~400ℓ/10a	摘採14日前まで	1回
そらまめ	アブラムシ類	3,000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	
非結球あぶらな科葉菜類 (こまつな、非結球はくさい、 みずな、なばな類を除く)	アオムシ	2,000		収穫前日まで		
こまつな	アオムシ	2,000~4,000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	
非結球はくさい	アオムシ	2,000		収穫前日まで	5回以内	
みずな	アブラムシ類、ダイコンハムシ ヤサイゾウムシ	2,000~3,000	100~300ℓ/10a	収穫14日前まで	2回以内	
つるむらさき	アオムシ	2,000		収穫7日前まで	2回以内	
食用ゆり	ヨトウムシ	3,000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	5回以内	
食用亜麻	アブラムシ類	2,000		収穫7日前まで	2回以内	
葉ごぼう	アブラムシ類	2,000	100~300ℓ/10a	収穫3日前まで	3回以内	
ごま	アブラムシ類、カメムシ類	2,000		収穫21日前まで	1回	
はこべ	オオタバコガ	3,000	100~300ℓ/10a	発生初期	6回以内	
花き類・観葉植物 (はばたんを除く)	アブラムシ類	2,000~4,000		200~700ℓ/10a	発生初期	6回以内
はばたん	カメムシ類、ハマキムシ類、ヨトウムシ類	2,000	200~700ℓ/10a		発生初期	6回以内
樹木類(くちなしを除く)	アオムシ	2,000~4,000		200~700ℓ/10a	発生初期	6回以内
くちなし	アブラムシ類	2,000	200~700ℓ/10a		発生初期	6回以内
樹木類(くちなしを除く)	ケムシ類、アブラムシ類、シャクトリムシ類	4,000~8,000		200~700ℓ/10a	発生初期	6回以内
くちなし	アザミウマ類	2,000	200~700ℓ/10a		発生初期	6回以内

*印は本剤及びベルメトリンを含む農薬の総使用回数

*1:本剤は3回以内、ベルメトリンを含む農薬の総使用回数は6回以内(乳剤は3回以内、粒剤は3回以内) *2:本剤は5回以内(株元灌注は2回以内)、ベルメトリンを含む農薬の総使用回数は5回以内(株元灌注は2回以内)
*3:本剤は2回以内、ベルメトリンを含む農薬の総使用回数は4回以内(散布は2回以内) *4:本剤は2回以内、ベルメトリンを含む農薬の総使用回数は4回以内(乳剤は2回以内、粒剤は2回以内) *5:本剤は3回以内、ベルメトリンを含む農薬の総使用回数は4回以内(株元散布は1回以内、散布及び噴射は合計3回以内)

使用上の注意事項(抜粋)



- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- かんきつ、茶での散布は、場合によりハダニ類が増えることがあるので注意してください。
- みずかけな(水掛菜)、カラー及び花はすに使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用后14日間は入水しないでください。
- ねぎのシロイチモジヨトウの防除に使用する場合は、食入前の若令幼虫期に散布してください。
- 無人航空機による散布に使用する場合は、無人航空機散布の注意を守ってください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合は吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 原液は眼に対して刺激性があるので、薬液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 原液は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 使用の際は、農薬用マスク、手袋などを着用してください。また、薬液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ① ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
 - ② 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - ③ 関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着するおそれのある場所では使用しないでください。
- 水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。

● 小児の手の届く所には置かないでください。● 空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

