

悪い虫はおらんか

国宝「風神雷神図屏風」建仁寺蔵

りんご・落葉果樹の害虫防除に

イカスチ[®]WDG



リンゴコカクモンハマキ



モモシンクイガ



キンモンホソガ

りんご・落葉果樹の害虫防除に

イカズチ®WDG

優れた殺虫活性 合成ピレスロイド系の殺虫剤で、主要害虫に対して優れた殺虫活性を示します。**優れた残効性** 主要害虫に十分な残効を有し、特にモモシクイガに対し長期の果実侵入阻止効果を有します。**使いやすい製剤** 希釈時の粉立ちが少なく、使用者への安全と使いやすさに配慮した製剤です。

■適用害虫の範囲および使用方法

有効成分:シベルメトリン…9.0%

医薬用外劇物


作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用流量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	シベルメトリンを含む 農薬の総使用回数
りんご	カメムシ類、シンクイムシ類 ハマキムシ類 キンモンホソガ アブラムシ類 ギンモンハモグリガ ヨモギエダシャク キリガ類 モモチョッキリゾウムシ	1,500	200~700 ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
なし	カメムシ類、シンクイムシ類				3回以内		3回以内
もも	カメムシ類 シンクイムシ類 アブラムシ類				5回以内		5回以内
ネクタリン	モモハモグリガ アザミウマ類				2回以内		2回以内
すもも	シンクイムシ類			収穫21日前まで	5回以内		5回以内
あんず	アメリカシロヒトリ				5回以内		5回以内
ぶどう	アザミウマ類、コガネムシ類 フタテンヒメコバイ クビアカスカシバ						

2019年11月現在の登録内容

■試験成績

りんご／モモシクイガに対する効果[果実侵入阻止効果の持続期間]


(2009年 青森県産業技術センターりんご研究所)



供試作物: りんご(品種:ふじ) 21年生
 区制・反復: 1区2樹・反復なし
 試験方法: 所定日に供試樹から5果を採取し、室内でモモシクイガの卵を接種。孵化後に食入幼虫数を調査し、食入率を算出。
 散布日: 7月29日(20ℓ/樹)
 果実採取日: 7月29日(散布当日)、8月1日(3日後)、8月6日(8日後)、8月13日(15日後)、8月24日(26日後)、8月31日(33日後)

りんご／リンゴコカクモンハマキに対する効果

(2008年 青森県農林総合研究センターりんご試験場)



供試作物: りんご(品種:ふじ) ポット植2年生
 発生状況: 多発生(接種)
 区制・反復: 1区5ポット・反復なし
 試験方法: 8月8日に累代飼育虫卵塊を接種し、その4日後(1齢幼虫期)に供試薬剤を散布。
 散布6日後に幼虫数を調査。
 散布日: 8月12日(2ℓ/区)
 調査日: 8月18日(散布6日後)

⚠ 使用上の注意事項

- ボルドー液と混用する場合は使用直前に混合してください。
- 蜜に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、蜜に付着するおそれのある場所では使用しないでください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺にかならないようにしてください。
 - 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。
- 誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けさせてください。

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤はのど、鼻、皮膚などを刺激する場合、また、かゆみを生じる場合があるので注意してください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗顔してください。
- 摘果等の作業の際は、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 水産動植物(魚類、甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器・空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 直射日光を避け、鍵のかかるなるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 小児の手の届く所には置かないでください。● 空袋・空容器は園場等に放置せず適切に処理してください。

01R11K19I115:ZS

2019年11月作成(全新企画社)

大地のめぐみ、まっすぐへ
SCA GROUP

住友化学

〒104-8260 東京都中央区新川2丁目27番1号

お客様相談室 ☎ 0570-058-669

農業支援サイト 農力 <https://www.i-nouryoku.com>