

★適用作物

きゅうり・トマト・ミニトマト・いちご



大切な果菜★を守る

農林水産省登録
第24265号

殺菌剤

カナメ
フロアブル®



防除の要、
カナメ
現る。



キュウリ灰色かび病



キュウリ菌核病



トマト灰色かび病



イチゴうどんこ病



大切な果菜*を守る――

★適用表参照

殺菌剤

カナメ
フロアブル®

医薬用外劇物

殺菌剤分類 7

有効成分：インピルフルキサム…37.0%
カナメ・KANAMEは住友化学（株）の登録商標です

特長

- 1 灰色かび病、菌核病、うどんこ病など、幅広い病害に対し安定した防除効果を示します。
- 2 浸達性、浸透移行性を有します。
- 3 多くの作物で収穫前日まで使用できます。

適用病害の範囲及び使用方法（抜粋）

2024年9月現在の登録内容（太字は2024年9月11日適用拡大）

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (ℓ/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	インピルフルキサムを 含む農薬の総使用回数
トマト ミニトマト	うどんこ病 菌核病 すすかび病 灰色かび病 葉かび病 褐色輪紋病 斑点病	4000	100～300	収穫前日 まで	4回以内	散布	4回以内
きゅうり	うどんこ病 菌核病 灰色かび病						
いちご	うどんこ病 灰色かび病						

○カナメフロアブルは他作物にも登録があります。詳細はラベルやホームページをご覧ください。

⚠ 使用上の注意事項（抜粋）

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 畜に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。かかった場合3日間は給桑しないでください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 使用の際は防護マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 施設内で使用する場合、窓等を開放し十分に換気してから施設内に立ち入ってください。
- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 直射日光を避け、食品と区別して、鍵のかかるなるべく低温な場所に密栓して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。 ●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

06R9I24K42:Z

2024年9月作成

農業・肥料に関する
総合情報サイト【i-農力】や
各種SNSはこちら



住友化学

〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号