

★適用作物

結球あぶらな科葉菜類・ブロッコリー・

レタス類（レタス、非結球レタス、エンダイブ、トレビス、プンタレッラを含む）



大切な葉菜\*を守る

農林水産省登録  
第24265号

殺菌剤

# カナメ

フロアブル®



防除の要、カナメ現る



キャベツ菌核病



キャベツ株腐病



ハクサイ尻腐病



ブロッコリー黒すす病



レタスすそ枯病



大切な葉菜\*を守る

\*適用表参照

殺菌剤

カナメ  
フロアブル

医薬用外劇物

殺菌剤分類 7

有効成分：インピルフルキサム…37.0%  
カナメ・KANAMEは住友化学(株)の登録商標です

特長

- 菌核病、リゾクトニア病害(キャベツ株腐病、ハクサイ尻腐病、レタスすそ枯病)に対し優れた防除効果を示します。
- 浸達性、浸透移行性を有します。
- 多くの作物で収穫前日まで使用できます。

適用病害の範囲及び使用方法(抜粋)

2024年6月現在の登録内容

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量(ℓ/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	インピルフルキサムを含む農薬の総使用回数
結球あぶらな科葉菜類※1 (はくさい、キャベツを除く)	菌核病	4000	100~300	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
はくさい	菌核病 尻腐病						
キャベツ	菌核病 株腐病						
ブロッコリー	菌核病 黒すす病						
レタス類※2	菌核病 灰色かび病 すそ枯病						

※1 結球あぶらな科葉菜類：キャベツ、はくさい、メキャベツを含みます。

※2 レタス類：レタス、非結球レタス、エンダイブ、トレビス、ブントレタスを含みます。

○カナメフロアブルは他作物にも登録があります。詳細はラベルやホームページをご覧ください。

使用上の注意事項(抜粋)

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に病害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。かかった場合3日間は給桑しないでください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 使用の際は防護マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 施設内で使用する場合、窓等を開放し十分に換気してから施設内に立ち入ってください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 直射日光を避け、食品と区別して、鍵のかかるなるべく低温な場所に密栓して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。 ●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

06R6F24K41:Z

2024年6月作成

農業・肥料に関する  
総合情報サイト【i-農力】や  
各種SNSはこちら



住友化学

〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号

お客様相談室 0570-058-669

(または ☎03-6630-3322)