

穿孔性害虫防除剤

農林水産省登録
第12478号

ガットキラー[®]乳剤



コスカシバ成虫



もも



うめ



おうとう



コスカシバ幼虫/被害



ブドウトラカミキリ成虫



ぶどう



りんご



みかん



ゴマダラカミキリ成虫



桑

この樹、蝕まれたくない。

特 長

- 穿孔性害虫に強力な防除効果
- 優れた浸透力
- 安定した効果

適用害虫と使用方法

*印は本剤およびMEPを含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用時期	総使用回数*	使用方法
もも	コスカシバ	50～100倍	休眠期 (落葉後～萌芽前)	本剤:1回 MEP:6回以内 (#1)	樹幹部及び主枝に散布
おうとう				本剤:1回 MEP:2回以内 (#2)	
ぶどう	ブドウトラカミキリ	100倍		本剤:2回以内 MEP:4回以内 (#3)	
ネクタリン 小粒核果類 (うめ、すももを除く)	コスカシバ	50～100倍		3回以内	
うめ	キクイムシ類	100倍		1回	樹幹から地際部へ散布
	コスカシバ			2回以内	樹幹部及び主枝に散布
キクイムシ類	樹幹から地際部へ散布				
すもも	コスカシバ			100倍	本剤:1回 MEP:2回以内
	キクイムシ類				
みかん	カミキリムシ類	30～50倍	産卵～幼虫喰入期前 但し収穫14日前まで	本剤:1回 MEP:5回以内 (#1)	樹幹から地際部へ散布
なつみかん			産卵～幼虫喰入期前 但し収穫120日前まで	本剤:1回 MEP:3回以内 (#1)	
りんご		50～100倍	産卵初期～産卵最盛期 但し収穫30日前まで	3回以内	樹幹部及び主枝に散布
桑			萌芽前夏切り直後 晩秋蚕終了後		
	ヒメゾウムシ成虫	萌芽前			
		100倍	夏切り直後		

#1：樹幹処理は1回以内 #2：樹幹処理及び灌注処理は合計1回以内
 #3：収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内

令和7年8月末現在の登録内容

防除のポイント

●ブドウトラカミキリ（ぶどう）

若齢幼虫が枝の表皮部にいる秋期（落葉後）及び翌春の幼虫の発育直前（萌芽前）に本剤を樹幹部及び主枝に散布するのが有効です。

●ゴマダラカミキリ（りんご、みかん、なつみかん、桑）

りんご、みかん、なつみかんに対しては成虫飛来から産卵初期（産卵最盛期直前）の適期に本剤を樹幹から地際部に散布してください。桑に対しては萌芽前、夏切り直後、晩秋蚕終了後に散布してください。

●コスカシバ（もも、おうとう、小粒核果類）

落葉後～発芽前に本剤を樹幹部の加害部分に十分散布してください。予め虫糞、粗皮を取り除いてから散布するとより効果的です。

●ヒメゾウムシ（桑）

萌芽前及び夏切り直後に本剤を散布してください。

使用上の注意（抜粋）（詳細はラベルをご覧ください）

- ぶどうに対しては、休眠期（落葉後～萌芽前）に樹幹部および主枝に十分散布してください。萌芽後は新芽に葉害を生ずるので必ず萌芽前に散布を終えてください。
- もも、ネクタリン、うめ、おうとう、あんずのコスカシバ防除に使用する場合は休眠期（落葉後～萌芽前）に樹幹部のコスカシバ加害部に十分散布してください。あらかじめ虫糞、粗皮等を取り除いてから散布すると効果的です。萌芽後は葉害のおそれがあるので散布しないでください。
- 本剤をかんきつおよびりんごのカミキリムシ類防除に使用する場合は、次の注意を守ってください。
 - ・喰入幼虫に対しては殺虫効果は十分でなく、また残効性も比較的短いので散布の時期を失わないように注意してください。
 - ・かんきつでは6～7月、りんごでは6月末～7月末の成虫飛来から産卵初期（産卵最盛期直前）の適期に散布してください。地際近くの樹幹のくぼみは特に産卵加害が著しいので、この辺りへは十分薬液が到達するように散布してください。
 - ・散布液が葉にかかるると葉害を生ずるおそれがあるので、かからないように十分注意して樹幹部から地際部に散布してください。
- 自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意してください。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行ない、使い切ってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川などに流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

○使用前にはラベルをよく読んでください。○ラベル記載以外には使用しないでください。○小児の手の届く所には置かないでください。○空容器はほ場等に放置せず適切に処理してください。

07R8H25G02:Z

2025年9月作成

農薬・肥料に関する
総合情報サイト【i-農力】や
各種SNSはこちら



住友化学

〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号