



おおきなノビエに、大きな効果。



6葉
まで効く



キシウスズメノヒエ

別名ヨバイグサ、アゼバシリ、バクダングサとも呼ばれ、畦から一度入るとやっかいな雑草です。クリンチャーEWをしっかりと散布して枯らします。

アグロス

クリンチャー™ EW

水稲用除草剤

その効き目は6葉まで。 クリンチャーEWがノビエのとりこぼしを解決。

有効成分：シハロホップブチル…30.0%

使用時期

幅広い期間で使用でき、後発生したノビエ防除に適しています。

使用上のポイント

移植水稻



- キシュウスズメノヒエは、本田内の再生茎3～6葉期、畦畔からのほふく茎1m以内の株全体に散布
- アゼガヤは、草丈60cmまでに散布

直播水稻



展着剤は必ず加用



茎葉にムラなく直接散布



落水でも混水でも散布可能



無人航空機も可

適用雑草と使用方法

2021年12月現在の登録内容

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		総使用回数*	使用方法
			薬量又は希釈倍数	希釈水量又は使用液量		
移植水稻	ノビエ キシュウスズメノヒエ アゼガヤ	移植後20日～ノビエ6葉期 但し、収穫30日前まで	100mℓ/10a	25～100 ℓ / 10a	本剤 2回以内 シハロホップブチル 3回以内	混水散布又は 落水散布
	ノビエ	移植後20日～ノビエ4.5葉期 但し、収穫30日前まで		0.8～1.6 ℓ / 10a		無人航空機 による散布
直播水稻	一年生イネ科雑草	は種後10日～ノビエ5葉期 但し、収穫30日前まで	25～100 ℓ / 10a	0.8～1.6 ℓ / 10a		雑草茎葉散布 又は全面散布
		は種後10日～ノビエ4.5葉期 但し、収穫30日前まで	無人航空機 による散布			
稲 (箱育苗)	ノビエ	は種後10日～ノビエ5葉期	1,000倍	育苗箱 (30×60cm)当り18mℓ	本剤 1回 シハロホップブチル 3回以内	雑草茎葉散布 又は全面散布

*印は収穫物への残留回避のため、その日までに使用できる本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

効果・薬害等の注意

- 散布液は使用当日に調製してください。
- 乳濁性液体なので、使用の際は容器をよく振って均一な状態にしてから所定量を取り出してください。
- 展着剤を加用してください。
- 雑草茎葉にかかるよう散布してください。
- 本田内に再生するキシュウスズメノヒエでは再生茎3～6葉期が本剤散布の適期です。また、畦畔より侵入するキシュウスズメノヒエ防除では畦畔からのほふく茎1m以内の株全体に株元まで散布してください。
- アゼガヤには、草丈60cmまで有効なので時期を失しないように散布してください。
- 広葉雑草には効果がないので、広葉雑草が混在する圃場ではそれらに有効な剤と組み合わせ使用してください。
- 落水条件で散布する際はまきむらがないように均一に散布してください。
- 混水条件で散布する際は原液散布では効果がないので、散布液を使用当日に調製し、水の出入りを止めて混水のまま均一に散布し、少なくとも3～4日間は通常の混水状態(水深3～5cm程度)を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 漏水田(減水深2cm/日以上)では薬害が発生するおそれがあるので、使用しないでください。

- 少量散布(25～50ℓ/10a)には専用ノズルを使用してください。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ってください。
 - ①散布は散布機種種の散布基準に従って実施してください。
 - ②散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 - ③作業中、薬液が漏れないように機体の配管その他装置の十分な点検を行ってください。
 - ④周辺に水稻以外の作物が栽培されている場合は、無人航空機による本剤の散布は行わないでください。
 - ⑤水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意してください。
 - ⑥薬剤散布に使用した装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
 - ⑦本剤の散布に使用した無人航空機の散布装置は、水稻以外の作物への薬剤散布には使用しないでください。
 - ⑧散布薬剤の飛散によって、周辺の作物に薬害を生じるおそれがあるので、かからないように十分注意して散布してください。
- 本剤はとうもろこし、食用びえ、ソルガムなどのイネ科作物、キャベツ及びももの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合にはかからないよう十分注意してください。また、散布田の水田水をこれら作物に灌水しないようにしてください。

- 乾燥が続いた条件では除草効果が低下する場合がありますので注意してください。特に、乾田直播水稻に使用する場合は注意してください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用してください。特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

安全使用上の注意

- 誤飲に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は河川などに流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 魚毒性：水産動物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。本剤を使用した苗は養魚田に移植しないでください。
- 保管：直射日光を避け、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

03R12L21K17:CC

2021年12月作成

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCC GROUP

住友化学

〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号

お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト 農力 <https://www.i-nouryoku.com>

