

アグロス

# グリーンチャーjianボ<sup>TM</sup>

おおきなノビエに、**畦からポイツ。**



投げ入れるだけで、とりこぼしを解決。

# 効果は大きく、手間は軽く。クリンチャージャンボなら、高葉齢のノビエも、ただ投げ入れるだけで防除できます。

農林水産省登録:第19794号  
有効成分:シハロホップブチル…1.8%

## ①ジャンボ剤だから、手間いらず

散布器具も不要で、ドリフトの心配もなく、空き容器の処理の手間もありません。女性や高齢者の方でも、より簡便になり使いやすくなりました。


## ②ジャンボ剤だから、あらゆる状況に対応

不整形の圃場や棚田などが多い日本の水稲環境で、その特性をいかんなく発揮。請負耕作の増加や高齢化の進展といった栽培環境の変化にも応えます。

## ③ノビエに対して高い効果を発揮

ノビエの多発田、後発生・とりこぼしに有効です。優れた拡散性と、速やかな茎葉部からの吸収移行により、効果を発揮します。

### 使用時期



**適用雑草と使用方法** 本剤は対象雑草の生育ステージによって使用量が異なるので注意してください。

2019年9月現在の登録内容

| 作物名  | 適用雑草名                     | 使用時期                         | 使用量                        | 総使用回数*                    | 使用方法                        |
|------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 移植水稲 | ノビエ<br>キシュウスズメノヒエ<br>アゼガヤ | 移植後7日～ノビエ4葉期<br>但し、収穫30日前まで  | 小包装(パック)<br>20個(1kg)/10a   | 本剤 2回以内<br>シハロホップブチル 3回以内 | 水田に<br>小包装(パック)のまま<br>投げ入れる |
|      |                           | 移植後25日～ノビエ5葉期<br>但し、収穫30日前まで | 小包装(パック)<br>30個(1.5kg)/10a |                           |                             |
| 直播水稲 | ノビエ                       | は種後10日～ノビエ3葉期<br>但し、収穫30日前まで | 小包装(パック)<br>20個(1kg)/10a   |                           |                             |
|      |                           | は種後25日～ノビエ4葉期<br>但し、収穫30日前まで | 小包装(パック)<br>30個(1.5kg)/10a |                           |                             |

\*印は、収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

### △効果・薬害等の注意

- 広葉雑草には効果がないので、広葉雑草が混在する圃場ではそれらに有効な剤と組み合わせで使用してください。
- 散布に当っては水の出入りを止めて湛水のまま田面に均一に散布し、少なくとも3～4日間は通常の湛水状態(水深3～5cm程度)を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- とうもろこし、食用びえ、ソルガムなどのイネ科作物の生育を阻害するおそれがあるので、散布田の水田水をこれら作物に灌漑しないようにしてください。
- 藻類または表層剥離の発生しやすい水田では、有効な剤との組み合わせで使用してください。
- 砂質土壌の水田及び漏水田(減水深2cm/日以上)では使用を避けてください。
- 使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用してください。特に初めて使用する場合や異常気象時は病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 必要量を購入し、できるだけ残すことなく使い切ってください。散布後の空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。

### △安全使用上の注意

- 小包装(パック)に使用しているフィルムは水溶性のため、ぬれた手や汗ばんだ手で作業したり、降雨等で破袋しないように注意してください。
  - 水溶性フィルムが破袋した場合は、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。(刺激性)
  - 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう注意して使用してください。
  - 散布後は水管理に注意してください。
  - 空容器・空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 保管** 直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。吸湿性があるので湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を強く閉じて保管してください。袋の中味のバックは強く加圧されると包装材フィルムが劣化するおそれがあるので、下積みにならないようにしてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

01R9I19K06:CC

2019年9月作成

大地のめぐみ、まっすぐ人へ  
SCC GROUP

住友化学

〒104-8260 東京都中央区新川12丁目27番1号

お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト 農力 <https://www.i-nouryoku.com>

