

水稻用初・中期一発処理除草剤



# ブエモン<sup>®</sup> 1キロ粒剤

除草のすぐ腕、  
ここに参上。

ノビエをはじめ、さまざまな雑草に優れた効果！



ノビエ



ホタルイ



コナギ



コウキヤガラ



クログワイ



オモダカ

ゴエモンは住友化学(株)の登録商標 農林水産省登録 第23381号

# ゴエモン<sup>®</sup>1キロ粒剤

**ノビエに卓効の新規成分配合**

イブフェンカルバゾンの配合により優れた効果を発揮

**さまざまな雑草に優れた効果**

多年生雑草・SU抵抗性雑草に有効

**田植同時処理が可能**

イネに対する高い安全性と雑草防除の省力化に貢献

## 適用と使用方法

有効成分:イブフェンカルバゾン…2.5% イマズスルフロン…0.90% プロモブチド…9.0%

## 主要雑草に対する使用適期

| 作物名  | 適用雑草名                                                                                                        | 使用時期                              | 使用量     | 本剤の使用回数 | 使用方法                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------------------------------|
| 移植水稻 | 水田一年生雑草 及び<br>マツバイ、ホタルイ<br>ウリカワ、ミズガヤツリ<br>ヘラオモダカ、ヒルムシロ<br>セリ、オモダカ<br>クログワイ、コウキヤガラ<br>シズイ<br>アオミドロ・藻類による表層はく離 | 移植時                               | 1kg/10a | 1回      | 田植同時散布機で<br>施用                  |
|      |                                                                                                              | 移植直後～ノビエ2.5葉期<br>ただし、<br>移植後30日まで |         |         | 湛水散布<br>又は<br>無人ヘリコプター<br>による散布 |
| 直播水稻 | 水田一年生雑草 及び<br>マツバイ、ホタルイ<br>ウリカワ、ミズガヤツリ<br>ヒルムシロ、セリ<br>アオミドロ・藻類による表層はく離                                       | 稲1葉期～ノビエ2.5葉期<br>ただし、<br>収穫90日前まで |         |         |                                 |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| ホタルイ<br>ウリカワ<br>ミズガヤツリ  | 2葉期まで           |
| ヒルムシロ                   | 発生期まで           |
| セリ                      | 再生前から<br>再生始期まで |
| オモダカ<br>クログワイ<br>コウキヤガラ | 発生始期まで          |
| シズイ                     | 草丈3cmまで         |
| アオミドロ・藻類<br>による表層はく離    | 発生前             |

**[有効成分の総使用回数]** イブフェンカルバゾンを含む農薬の総使用回数:2回以内 イマズスルフロンを含む農薬の総使用回数:2回以内 プロモブチドを含む農薬の総使用回数:2回以内  
(2017年11月現在の登録内容)

## 田植同時散布での上手な使い方 散布量/10a当り1kg

※散布量の調整については各散布機の取扱説明書をご覧ください。ご購入になった農機具店にお問い合わせください。  
※実際の散布に当たっては散布量の微調整が必要です。


**1 均平化作業・植付けはいいねに**

田面が凹凸していると薬剤が均一に広がらず、効果不良・薬害の原因になります。



**2 極端に土のもどりが悪い水田では使用をさける**


移植後の根が露出していると、薬剤が直接根に触れ薬害の危険があります。



**3 田植同時処理はひとつの浅水で!**


水がない状態では薬剤の拡散が悪く、効果不良・薬害の原因になります。

苗が水没するような深水もさけてください。苗の活着が悪く生育抑制の原因となります。



**4 移植深度は適正に!**


極端な浅植では根が露出し薬害原因となります。根が土壌中に隠れるよう、適正な移植深度に田植機を設定してください。



**5 移植後は速やかに入水を!**

移植後は速やかに水深3~5cmになるよう入水してください。

入水後は止水し、3~4日間は通常の湛水状態を保ち、7日間は落水、かけ流しはしないでください。



## 使用上の注意

- 雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに時期を失しないように使用してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に使用するよう注意してください。
- 散布の際は、水の出入りを止めて湛水状態(水深3~5cm)でまきむらが生じないように均一に散布してください。また、極端な浅水や深水での使用はさけてください。
- 散布後3~4日間はそのまま湛水を保ち、田面を露出させないようにし、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。また、入水は静かに行ってください。
- 浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平化及び植付作業はいいねに行ってください。未熟有機物を施用した場合は、特にいいねに行ってください。
- 直播水稻で使用する場合、稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
- 以下のような条件下では薬害が発生するおそれがあるので使用をさけてください。
  - ①砂質土壌の水田及び漏水の大きな水田(減水深が2cm/日以上)
  - ②軟弱な苗を移植した水田
  - ③極端な浅植えの水田
- 著しい多雨条件では除草効果が低下する場合があるので使用はさしひかえてください。
- 散布田の田面水を他の作物に灌水しないでください。
- その殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これら作物の生育期に隣接田で使用する場合には十分注意してください。
- いぐさ栽培予定水田では使用しないでください。
- 移植前に生育したミズガヤツリには効果が劣るので、物理的防除方法などを用いて移植前に防除してから使用してください。

- オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く、遅い発生のもまでは十分な効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 無人ヘリコプターによる散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 本剤を無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は、次の注意を守ってください。
  - ①散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。
  - ②専用の粒剤散布装置によって湛水散布してください。
  - ③事前に薬剤の物理性に合わせて粒剤散布装置のメタリング開度を調整してください。
  - ④散布薬剤の飛散によって他の植物に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、当該水田周辺部への飛散防止のため散布装置のインペラの回転数を調整し、ほ場の端から5m離れた位置からほ場内に散布してください。
  - ⑤水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないよう十分注意してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。 ●空袋・空容器は農場等に放置せず適切に処理してください。

29H12L17G27:ZS

2017年12月作成(全新企画社)

大地のめぐみ、まっすぐ人へ  
SCA GROUP

**住友化学**

〒104-8260 東京都中央区新川2丁目27番1号

お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト 農力 <https://www.i-nouryoku.com>

