


ツインこまきを用いた

ジャンボたにしくん[®] の**効果的**な使い方！



効率よくスクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）を退治するために！


鉄コーティング直播の場合

散布適期

播種時

クボタ田植機アタッチメント
ツインこまき

播種と同時に**除草剤**と
ジャンボたにしくんを散布！



ツインこまきで『ジャンボたにしくん』
2kg/10aを散布し、圃場にいる
スクミリンゴガイを防除しましょう！

追加散布

入水時

追加で散布（使用回数2回まで）

圃場に入水すると周辺からスクミリンゴガイが圃場に入りこみ、稲が食害される可能性があります。入水時にも動力散粒機等で『ジャンボたにしくん』2kg/10aを散布するのがおすすめです！



●入水後に散布する場合は、水口や額縁部にもムラが出ないように、均一に散布しましょう！

※水温が低いなどの理由で、摂食量が減り、効果が落ちる場合があります。
※入水直後など、極端なにごり水の場合での散布は避け、にごりが落ち着いたタイミングで散布してください。

殺虫剤

有効成分：メタルデヒド…5.0%

ジャンボたにしくん®



特長

1. 殺貝効果に優れます。

2. 移植栽培・直播栽培
どちらにも使えます。

3. 粒数が多く、均一に
散布しやすいです。(約144,000粒/袋)



人畜に対する安全性が高く、水産動物**に対しても影響が少ない

**コイ、オオミジンコ

適用害虫と
使用方法



活発に動き回る
スクミリンゴガイ



スクミリンゴガイ
の卵

『ジャンボたにしくん』は主にスクミリンゴガイが
食べるにより効果を発揮する薬剤です。
スクミリンゴガイが活発に動き始めた時が散布
タイミングです！

2017年3月末日現在の登録内容

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	メタルデヒドを含む 農薬の総使用回数
稲	スクミリンゴガイ	1~2kg/10a	収穫60日前まで	2回以内	散布	2回以内



＜使用上の注意事項＞

- ・スクミリンゴガイは稲苗の柔らかい時期に加害するので、は種後または移植後にスクミリンゴガイを確認したら直ちに散布してください。
- ・本剤は湛水状態(湛水深3~5cm)で均一に散布し、散布後7日間は湛水状態にして、落水やかけ流しはしないでください。
- ・水田以外の貝の生息地には絶対に使用しないでください。
- ・本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に、初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋は圃場等に放置せず適切に処理してください。

29H4D17S137:OG

2017年4月作成(小城プロデュース)

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCC GROUP



住友化学

〒104-8260 東京都中央区新川2丁目27番1号

お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト 農力 <https://www.i-nouryoku.com>

