

白葉枯病
に
適用拡大


水稻育苗箱専用殺菌剤

農林水産省登録 第23186号

スタウト®

顆粒水和剤

病害の侵入を許さぬ強固な守り




育苗箱灌注処理で、いもち病をしっかり防除!!



いもち病

は種時から
移植当日まで
いつでも使用可能



水稻育苗箱専用殺菌剤 スタウト® 顆粒水和剤

農林水産省登録 第23186号 有効成分：イソチアニル……40.0%

特 長

① いもち病に対し優れた効果

●いもち病に高活性なイソチアニルを有効成分とする顆粒水和剤 ●育苗箱灌注処理で本田の葉いもちを防除

② 幅広い使用時期 ●は種時から移植時まで使用可能

③ イネに対する高い安全性

適用病害および使用方法


作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イソチアニルを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	白葉枯病	200倍	育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5ℓ) 1箱当り500mℓ	は種時覆土前	1回	灌注	3回以内 (移植時までの処理は) 1回以内、 本田では2回以内
		400倍	育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5ℓ) 1箱当り1000mℓ				
	いもち病 もみ枯細菌病	200倍	育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5ℓ) 1箱当り500mℓ	は種時覆土前～ 移植当日			
		400倍	育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5ℓ) 1箱当り1000mℓ				

2017年5月17日現在の登録内容(太字は適用拡大した病害)

試験成績

■いもち病(葉いもち)に対する効果①


2011年 秋田県立大学



●品種：あきたこまち ●は種日：4月20日 ●移植日：5月25日 ●発生状況：中発生(接種) ●調査日：7月28日

■いもち病(葉いもち)に対する効果②

2011年 住友化学株式会社(兵庫)



●品種：ヒノヒカリ ●は種日：5月17日 ●移植日：6月7日 ●発生状況：中発生(接種) ●調査日：7月29日

◆ 注意事項

＜効果・被害等の注意＞

- 薬液の調製は所定量の水に本剤を所定量加え十分攪拌してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗などには薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
- 本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきは丁寧に行い、移植後田面が露出したりしないように注意してください。
- いぐさ栽培予定水田では使用しないでください。また、本剤を処理した稲苗を移植した水田ではいぐさを栽培しないでください。
- きく等の他作物に影響を及ぼす場合があるので、薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように処理してください。

- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

＜安全使用上の注意＞

- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗い、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は園場等に放置せず適切に処理してください。

29H7G17S113:ZS

2017年7月作成(全新企画社)

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCC GROUP



住友化学

〒104-8260 東京都中央区新川2丁目27番1号

お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト 農力 <https://www.i-nouryoku.com>

