

果樹の細菌性病害に！

スターナ[®] 水和剤

®は住友化学（株）の登録商標です。



**もも・ネクタリンのせん孔細菌病、
小粒核果類のかいよう病防除に！**

（小粒核果類には、うめ・すもも・あんずが含まれます。）

もも・ネクタリンの
せん孔細菌病、
小粒核果類の
かいよう病防除に!

スターナ[®] 水和剤

有効成分：オキシリニク酸…20.0%

特長

既存薬剤の耐性菌にも効果あり!

早めの**予防散布**が効果的!

もも・ネクタリン・小粒核果類に**収穫7日前**まで使えます!

果樹以外にも登録が多数あり**使いやすい!** (水稻や多くの野菜など)

果樹のことなら
ボクに
おまかせ!



適用病害と 使用方法 (一部抜粋)

2019年4月現在の登録内容

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	オキシリニク酸を 含む農薬の 総使用回数
もも ネクタリン	せん孔細菌病	1000倍	200~ 700ℓ/10a	収穫 7日前まで	3回以内	散布	3回以内
小粒核果類 (すももを除く)	かいよう病						
すもも	かいよう病 黒班病						

果樹では他に、なしに登録があります

上手な 使い方

Point.1

予防的に使用してください。

Point.2

作用性の異なる薬剤との
ローテーション防除を
行ってください。(耐性菌対策)

Point.3

防風ネットの設置、
罹病枝の除去等の
耕種的防除と
組み合わせて防除してください。

ココが重要!



! 使用上の注意(抜粋) 詳細はラベルをご参照ください。

- ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- ・適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
- ・本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- ・誤飲、誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を

- 感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- ・本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- ・使用の際には農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣など着用してください。また散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- ・直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

31H4D19S112:OG

2019年4月作成(小城プロデュース)

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCC GROUP



住友化学

〒104-8260 東京都中央区新川2丁目27番1号

お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト 農力 <https://www.i-nouryoku.com>