




水稻用初期除草剤

スミクレート® 粒剤


ホタルイをはじめ、
ノビエ、コナギなどに
優れた効果!!

ホタルイなどに
効果の高い
プロモブチド 配合
**3キロ
粒剤**




開花期

ホタルイ



ノビエ



コナギ

2つの優れた成分が効果的に働きます。

水稻用初期除草剤

スミクレート[®] 粒剤

■ 有効成分：ブタミホス…… 3.5%
ブロモブチド… 3.0%

スミクレート粒剤の特長

1

ホタルイに優れた効果

ノビエをはじめ一年生雑草、マツバイ、ホタルイに高い効果を発揮。特に、有効成分ブロモブチドはスルホニルウレア抵抗性ホタルイに対しても安定した優れた効果を示します。

2

ブロモブチド配合の除草剤が2回使用可能

ブロモブチド配合の除草剤が2回使えるようになったので、ホタルイに対して効果的な体系処理が可能です。

3

水稻への影響が少ない

水稻に対して高い選択性があり、土壌条件、気象条件の影響を受けることが少ない薬剤です。

■適用と使用方法

2019年5月現在の登録内容

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ (北海道)	移植後3日～ノビエ1.5葉期 但し、 移植後30日まで	砂壤土～埴土	3kg/10a	1回	温水散布	全域の普通期 及び 早期栽培地帯

ブタミホスを含む
農薬の総使用回数

1回


ブロモブチドを含む
農薬の総使用回数

2回以内

上手に使って大きな効果。適期・適量を守りましょう。

代かきから移植までは長くおかず、移植後3日からノビエ1.5葉期までに、10アール当り3kgを均一に散布してください。より効果を安定させるためには、早めに処理するのがポイントです。

●使用時期



●使用薬量 10アール当り3kg(1袋)

使用上の注意(抜粋)

- 本剤は貯蔵中に一部固まる場合もあるので、使用に際してはほぐして使用してください。
- 本剤は雑草発生始期(ノビエの出芽始期)に有効なので雑草の発生状況をよく観察し、ノビエは1.5葉期までに、ホタルイには2葉期までに、ヘラオモダカには発生始期までに時期を失しないように散布してください。また広葉雑草の多発田での使用はさけてください。
- 湛水状態(水深3～5cm)で播きむらのないように均一に散布し、散布後3～4日間はそのままの水深を保ち、田面を露出させたり水を切らしたりしないように注意し、散布後7日間は落水、かけ流しはさけてください。
- 軟弱苗を植付けた水田、極端な浅植えをした水田及び異常高温下や極端な深水での使用の場合、薬害を生じるおそれがあるので使用をさけてください。
- 砂質土壌や漏水の大きな水田(減水深が2cm/日以上)では効果不足や薬害の原因となるので使用はさけてください。
- 本剤の使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 水産動植物(甲殻類、藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。 ●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

01R5E19S100:ZS

2019年5月作成(全新企画社)

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCC GROUP

住友化学

〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号

お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト 農力 <https://www.i-nouryoku.com>

