



ジエトフェンカルブ含有の
統一シンボルマークです。

農林水産省登録 第17693号



シャープな切れ味!! ひとあじ違います

きゅうり褐斑病 に高い効果が期待できます

殺菌剤
スミブレンド[®] 水和剤

スミブレンドは住友化学(株)
の登録商標

耐性菌にも有効!! ひとあじ違います

殺菌剤 スミブレント[®] 水和剤

有効成分：ジエトフェンカルブ・・・・・・・・12.5% プロシミドン・・・・・・・・37.5%

特長

- 1 きゅうり褐斑病に優れた効果
- 2 灰色かび病、菌核病、すいかつる枯病にも効果的
- 3 各種耐性菌にも有効



適用病害と使用方法

2018年4月現在の登録内容

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	10アール 当り 散布量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	ジエトフェンカルブ を含む農薬の 総使用回数	プロシミドン を含む農薬の 総使用回数
みかん	灰色かび病	2000	200～ 700ℓ	開花期ただし、 30日まで	3回以内	散布	5回以内	3回以内
トマト				前日まで	5回以内		6回以内	6回以内 (常温煙霧は 2回以内)
なす	菌核病	1500					5回以内	
きゅうり	灰色かび病	1500 ～2000						
	褐斑病							
	菌核病	1500					5回以内	
レタス	灰色かび病 菌核病	1000 ～2000						7日まで
たまねぎ	灰色かび病	1500	21日まで	5回以内				
いんげんまめ	菌核病							
すいか	つる枯病	1500 ～2000	21日まで	5回以内	5回以内		5回以内	
	菌核病							
キウイフルーツ	貯蔵病害 (灰色かび病)	2000	200～ 700ℓ	前日まで	4回以内		4回以内	4回以内
ふき	灰色かび病	1500	150～ 400ℓ	14日まで	2回以内		2回以内	2回以内
みつば		2000	—	21日まで	1回		1回	1回
つるむらさき	菌核病		150～ 300ℓ		2回以内	2回以内	2回以内	
にがうり	斑点病		100～ 300ℓ	7日まで				

上手な使い方

本剤を有効かつ末永くご愛用いただくために、
下記の点にご留意ください。

- 1 予防的散布を行なってください。
- 2 的確な薬剤散布を行なってください。
- 3 作用性の異なる薬剤と組み合わせてください。
- 4 耕種的防除と組み合わせてください。

特にハウス果菜類に対しては……

- 本剤のみの連用はさけ、他の有効な薬剤も活用してください。
- 本格発生初期の防除に特に重点をおき、多発生となる前に抑えることが重要です。
- 本剤の長い残効性と的確な散布タイミングにより、通常2～3週間あけられますので、本剤の使用回数をあまり増加させないようご留意ください。

《使用上の注意》

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさけてください。
- 定植直後又は幼苗、軟弱苗等には薬害を生じるおそれがあるので使用はさけてください。
- 高温時の散布は薬害を生じる場合があるので注意してください。
- トマトは薬害を生じやすいので、下記の注意事項を厳守してください。
 - 次の条件の場合は使用しないでください。
 - ①生育が一時停止するような低温にさらされることがある栽培をしている場合
 - ②軟弱徒長気味な栽培となっている場合
 - ③微量要素欠乏又はその疑いのある場合
 - ④高温多湿条件の場合
 - 使用する場合は次の注意を守ってください。
 - ①有機リン剤との混用はさける。
 - ②所定の薬量を厳守し、薬量過剰にならないようにする。
 - ③くり返し使用する場合は散布間隔を十分(14日以上)あける。

- あぶらな科作物(特に白菜、だいこん、ストック)には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため本剤の過度の連用はさけ、作用性の異なる薬剤と組み合わせで輪番で使用してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 誤飲、誤食などのないよう注意してください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗顔してください。
- 粉末は皮膚に対して刺激性があるので散布液調製時には手袋を着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすしてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

30H4D18S139:ZS

2018年4月作成(全新企画社)

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCA GROUP

住友化学

〒104-8260 東京都中央区新川2丁目27番1号

お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト 農力 <https://www.i-nouryoku.com>

