

# 果樹の害虫防除に!!

ネオニコチノイド系殺虫剤

# ダントツ® 水溶剤

ダントツは住友化学(株)の登録商標



等の主要害虫を  
幅広く防除!



容量: 125g  
250g

これ1本(125g)で  
500ℓ分  
(4000倍)



すももの  
クビアカツヤカミキリに  
適用拡大!!



ユキヤナギアブラムシ チャノキイロアザミウマ チャバネアオカメムシ フジコナカイガラムシ ゴマダラカミキリ キンモンホソガ モモンクイガ カキノヘタムシガ オウトウショウジョウバエ

# りんご・もも・ぶどう・なし・うめ・かんきつ・かき・おうとう等の害虫防除に!!



有効成分：クロチアニジン…16.0% 殺虫剤分類 4A

## 特長

- ①果樹の主要害虫を幅広く防除することができます。
- ②カメムシ類に対して速効的な殺虫力と吸汁抑制効果が期待できます。
- ③かんきつ・りんご・ぶどう・なし・うめ・おうとうは収穫前日、もも・かき・マンゴーは収穫7日前まで使えます。
- ④優れた防除効果が長期間持続します。
- ⑤粉立ちが少なく溶けやすい顆粒状の水溶剤です。

**希釈早見表**

水量	希釈倍数	
	2000倍	4000倍
20ℓ	10g	5g
100ℓ	50g	25g
500ℓ	250g	125g

4000倍の場合、125gボトル1本で500ℓの薬液ができます。

- 使用上の注意事項(抜粋)**
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
  - かんきつに樹幹散布を使用する場合は、樹幹部から地際部に十分量を散布または塗布してください。また、散布液が葉にかかるると薬害を生じるおそれがあるので、葉にかからないように十分に注意してください。
  - ぶどうに使用する場合、袋かけ前までの幼果期に散布すると品種によっては果粉が溶脱するおそれがあるので注意してください。
  - 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
  - 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

## 適用害虫と使用方法

2021年9月現在の登録内容(太字は2021年8月25日適用拡大)

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
りんご	カメムシ類、キンモンホソガ キンモンハモグリガ シンクイムシ類、アブラムシ類 コナカイガラムシ類 リンゴワタムシ、ケムシ類 コガネムシ類成虫	2000~4000	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布
	もも	コガネムシ類、クビアカツヤカミキリ アブラムシ類、モモハモグリガ シンクイムシ類、カメムシ類		2000~4000		
ネクタリン	コガネムシ類	2000	収穫3日前まで			
ぶどう	コナカイガラムシ類 チャノキヒロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ ブドウトラカミキリ カメムシ類、コガネムシ類	2000~4000	200~700ℓ/10a	収穫前日まで		
	なし	チュウコクナシキジラミ シンクイムシ類 コナカイガラムシ類 カメムシ類、ケムシ類		2000~4000		
うめ	アブラムシ類 ケシキスイ類、クビアカツヤカミキリ	2000	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布
あんず	アブラムシ類	4000				
すもも	クビアカツヤカミキリ アブラムシ類、カメムシ類	2000	200~700ℓ/10a	収穫3日前まで		
	かんきつ	アブラムシ類、アザミウマ類 ツノロウムシ アカマルカイガラムシ ナシマルカイガラムシ コナカイガラムシ類 ゴマダラカミキリ、ケシキスイ類 コアオハナムグリ カメムシ類、アゲハ類 ミカンハモグリガ、ミカンバエ コナジラミ類、ミカンキジラミ アオバハゴロモ カネタタキ		2000~4000	収穫前日まで	
かんきつ(苗木)	ミカンハモグリガ ゴマダラカミキリ ミカンキジラミ	20	100mℓ/樹	収穫150日前まで	2回以内	樹幹散布
	かんきつ(苗木)	ゴマダラカミキリ、ミカンハモグリガ アゲハ類、アブラムシ類	20	10~100mℓ/樹		
さんしょう(果実)	アザミウマ類	4000	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布
かき	アザミウマ類、コナカイガラムシ類 カキノヘタムシガ、カメムシ類 カキノヒメヨコバイ アブラムシ類、カメムシ類	2000~4000		収穫7日前まで		
びわ	カイガラムシ類 カミキリムシ類	2000	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布
いちじく	アザミウマ類	2000		収穫3日前まで		
マンゴー	コナカイガラムシ類 カメムシ類、クワイヒメヨコバイ アオバハゴロモ	2000~4000	200~700ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布
キウイフルーツ	アオバハゴロモ	2000		収穫前日まで		
パイナップル(苗木)	パイナップルコナカイガラムシ	2000	—	植付前	1回	10秒間 苗浸漬
パイナップル	ナガカタカイガラムシ ヒラタカタカイガラムシ オウトウショウジョウバエ カメムシ類	2000	200~700ℓ/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布
パイナップル	オウトウショウジョウバエ	2000		収穫前日まで		
おうとう	カメムシ類	2000~4000	200~700ℓ/10a	収穫45日前まで	3回以内	散布
ブルーベリー	アブラムシ類 ケムシ類、オウトウショウジョウバエ カメムシ類	2000~4000		収穫前日まで		
オリーブ	オリーブアナアキゾウムシ マエアカスカンメイガ	2000~4000	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布
オリーブ(葉)	マエアカスカンメイガ	4000		収穫120日前まで		
なつめ	ゴマダラカミキリ	4000	200~700ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布
なつめ	ゴマダラカミキリ	4000		収穫7日前まで		

ダントツ水溶剤は、他作物にも登録があります。詳細はラベルでご確認ください。

- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
- ①ミツバチの巣箱及びその周辺にからないようにしてください。
- ②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
- ③関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼

- に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗顔してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調整を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

03R9121D88:Z

2021年9月作成(全農教)

大地のめぐみ、まっすぐくへ  
SCG GROUP

住友化学



〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号  
お客様相談室 0570-058-669  
農業支援サイト 農業支援ポータル https://www.1-nouryoku.com  
住友化学アグリ事業部

