

豊作の女神が、
害虫から
大事な「ねぎ」を
守ります。



殺虫剤

ディアナ[®] SC

- ネギアザミウマ・ネギハモグリバエに
高い殺虫効果を発揮
- シロイチモジヨトウの同時防除が可能
- 収穫前日まで使用可能



ネギアザミウマ



ネギハモグリバエ



シロイチモジヨトウ

**葉ねぎ
にも
使えます**

※わけぎ、あさつきには
使用できません。

殺虫剤 ディアナ[®] SC

特長

- ネギアザミウマ・ネギハモグリバエに高い殺虫効果を発揮
- シロイチモジヨトウの同時防除が可能
- 収穫前日まで使用可能



【適用害虫と使用方法】

農林水産省登録 第22910号


殺虫剤分類 5
有効成分:スピネトラム…11.7%

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
ねぎ	アザミウマ類 シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ ネギコガ	2,500~5,000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布

*本剤およびそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。
※ディアナSCはねぎ以外にも登録があります。詳細はラベルをご確認ください。

(2020年6月現在の登録内容)

【試験成績(ねぎ)】



使用上の注意

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法にあわせ調節してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。桑葉にかかった場合には使用後約1ヶ月間は蚕に給餌しないでください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ①ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - ②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - ③関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 間引き菜、つまみ菜に使用しないでください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に被害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 使用の際は農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は園場等に放置せず適切に処理してください。

02R6F20D163:ZS

2020年6月作成(全新企画社)

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCC GROUP

住友化学



動画
チャンネルは
こちら！

〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号
お客様相談室 ☎0570-058-669
農業支援サイト 農薬力 <https://www.1-nouryoku.com>
住友化学アグロ事業部

