

豊作の女神

米国における
茶での残留基準値が
日本と同じ70ppmに
設定されました!



殺虫剤

ディアナ[®]
SC

様々な害虫から大事な作物を守り、豊かな実りをかなえます。



- 🌙 広い殺虫スペクトラム
- 🌙 ハマキムシ類に優れた効果
- 🌙 摘採前日まで使用可能



殺虫剤 ディアナ[®] SC

特 長

●広い殺虫スペクトラム

チョウ目害虫はもちろん、チャノキロアザミウマに対しても防除効果を発揮するので、幅広い害虫の防除が可能です。

●ハマキムシ類に優れた効果

各生育ステージ(卵・幼虫・成虫)に高い効果を示します。よって、散布適期が広く使いやすい薬剤です。

●摘採前日まで使用可能



【適用害虫と使用方法】





農林水産省登録 第22910号 有効成分:スピネトラム…11.7%

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
茶	チャノキロアザミウマ チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャハマキ ヨモギエダシャク チャトゲコナジラミ ニトベミノガ	2,500 ~ 5,000	200 ~ 400 ℓ/10a	摘採前日まで	1 回	散 布

※ディアナSCは、他作物にも登録があります。詳細はラベルでご確認ください。

(2019年9月現在の登録内容)

【試験成績】



使用上の注意(抜粋)

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法にあわせ調節してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- ⚠ ① 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。桑葉にかかった場合には使用後約1ヶ月間は蚕に給餌しないでください。
- ⚠ ② ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ① ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - ② 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - ③ 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- ⚠ ④ 使用の際は農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

●使用時にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋:空容器は園場等に放置せず適切に処理してください。

01R9I19D141:ZS

2019年9月作成(全新企画社)

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCA GROUP

住友化学

〒104-8260 東京都中央区新川2丁目27番1号

お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト 農力 <https://www.i-nouryoku.com>

